

RIESGOS RELACIONADOS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN



VÍA



FÁRMACOS



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

<p>ORAL</p>	<p>Fármacos de liberación prolongada (Morfina, Oxiconona, etc.)</p>	<p>Pautar dosis "cada 12h de reloj". No partir. No triturar. Tragar sin masticar.</p>
	<p>Omeprazol cápsulas</p>	<p>Si disfagia: Abrir la capsula. Mezclar (sin triturar) gránulos con agua o zumo de frutas. Agitar y tomar inmediatamente. No administrar esta mezcla por sondas entéricas.</p>
<p>SONDAS ENTÉRICAS</p>	<p>Esomeprazol comprimidos</p>	<p>No triturar. Mezclar con 20-30 ml de agua, agitar hasta completa dilución y administrar inmediatamente.</p>
	<p>Ondansetrón Comp/Ampolla</p>	<p>Diluir en 20-30 ml de agua, la ampolla o el comprimido pulverizado, y administrar inmediatamente.</p>
	<p>Metoclopramida Comp/Jarabe</p>	<p>Diluir en 20-30 ml de agua, el jarabe (más recomendado) o el comprimido pulverizado.</p>
<p>TRANSDÉRMICA</p>	<p>Fentanilo parche</p>	<p>Si necesita cortarlos; hacerlo en diagonal. Vigilar la adherencia del parche a la piel. Retirar el parche previo, antes de la nueva dosis. Consultar las instrucciones de uso de cada tipo de parche.</p>
<p>TRANSMUCOSA</p>	<p>Fentanilos de acción inmediata</p>	<p>Humedecer la boca. No masticar. No succionar. Consultar las instrucciones de uso de cada presentación.</p>
<p>SUBCUTÁNEA</p>	<p>Dexametasona</p>	<p>No mezclar con otros fármacos. Administrar por una vía subc de uso exclusivo. Administrar de forma lenta.</p>
	<p>Ketorolaco</p>	<p>No mezclar con otros fármacos. Administrar por una vía subc de uso exclusivo. Administrar de forma lenta.</p>
	<p>Levomepromazina</p>	<p>No mezclar con otros fármacos. Administrar por una vía subc de uso exclusivo. Rotar frecuentemente el punto de punción. Administrar diluido y de forma lenta.</p>
	<p>Midazolam</p>	<p>Intentar usar la concentración 5mg por cada ml, para administrar el menor volumen posible.</p>

*RECOMENDACIONES GENERALES:

Si hay pérdida de la vía oral, usar la tabla de equivalencia entre opioides.

En caso de sondas entéricas, administrar otros 10-15ml de agua, para arrastrar resto de fármacos.

En caso de vía subcutánea, administrar otros 0,3-0,5ml de suero salino para lavar la vía.

Si tiene nutrición enteral, interrumpirla 1h antes y reanudarla 2h después de la administración de medicamentos.

Los fármacos liposolubles (Diacepam, Metamizol, Paracetamol, Clorpromazina...) no se administran por vía subcutánea

La vía intramuscular, evitar la en la medida de lo posible.



FS FundeSalud



paliex

Plan ESTRATÉGICO del Servicio Extremeño de Salud



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SES Servicio Extremeño de Salud

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales