

ESTADÍSTICAS MUNDIALES

18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica (junio de 2016)

36,7 millones [34 millones–39,8 millones] de personas en todo el mundo vivían con el VIH (final de 2015)

2,1 millones [1,8 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH (final de 2015)

1,1 millones [940 000–1,3 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida (final de 2015)

78 millones [69,5 millones–87,6 millones] de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia (final de 2015)

35 millones [29,6–40,8 millones] de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia (final de 2015)

Personas que viven con el VIH

- En 2015, 36,7 millones [34 millones–39,8 millones] de personas vivían con el VIH.

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica

- A fecha de junio de 2016, 18.2 millones [16.1 millones–19.0 millones] de personas que vivían con el VIH tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica; en junio de 2015, la cifra alcanzaba los 15,8 millones y, en 2010, los 7,5 millones.
- Cerca del 46% [43%–50%] de todos los adultos que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento en 2015.
- Cerca del 77% [69%–86%] de las embarazadas que vivían con el VIH tuvo acceso a medicamentos antirretrovíricos en 2015 para prevenir la transmisión del VIH a sus bebés.

Nuevas infecciones por el VIH

- En 2015, 2,1 millones [1,8 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en todo el mundo.
- Los casos de nuevas infecciones en niños han descendido en un 50% desde 2010.
 - A nivel mundial, 150 000 [110 000–190 000] niños contrajeron la infección por el VIH en 2015, una cifra inferior a la de 2010, con 290 000 [250 000–350 000] nuevos casos.

- Desde el 2010 no han habido reducciones en nuevas infecciones por el HIV en adultos.
- Cada año desde el 2010, cerca de 1,9 millones [1,9 millones–2,2 millones] de adultos contrajeron la infección por el HIV.

Muertes relacionadas con el sida

- Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 45% desde las máximas registradas en 2005.
- En 2015, 1,1 millones [940 000–1,3 millones] de personas en todo el mundo fallecieron por causas relacionadas con el sida, en comparación con los datos registrados en 2005, con 2 millones [1,7 millones–2,3 millones] de muertes.

Tuberculosis y VIH

- La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH ha disminuido en un 32% desde 2004.
- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH; aproximadamente, una de cada tres muertes relacionadas con el sida se deben a dicha enfermedad.
- En 2014, el porcentaje de pacientes con tuberculosis VIH-positivos que empezaron o continuaron la terapia antirretrovírica alcanzó el 77%.

Inversiones

- Se estima que, a finales de 2015, se habían invertido 19 000 millones de dólares estadounidenses en la respuesta al sida en países de ingresos medios y bajos (entre los que no se incluyen aquellos que han pasado a formar parte recientemente de las categorías de ingresos altos).
- Los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al VIH en 2015 en dichos países.
- Las últimas estimaciones de ONUSIDA indican que se necesitarán 26 200 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020, y 23 900 millones en 2030.

ESTADÍSTICAS REGIONALES — 2015

Asia y el Pacífico

- En 2015, **5,1 millones [4,4 millones–5,9 millones]** de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2015, se dieron aproximadamente **300 000 [240 000–380 000]** nuevas infecciones por el VIH en la región.
 - Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un **5%**.
- En Asia y el Pacífico, **180 000 [150 000–220 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un **24%**.

- La cobertura del tratamiento en Asia y el Pacífico fue de un **41% [35%–47%]** con respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región.
- Se estima que, en 2015, **3 millones [2,3 millones–3,8 millones]** de adultos **no tuvieron acceso** a la terapia antirretrovírica en Asia y el Pacífico.
- En Asia y el Pacífico, se dieron **19 000 [16 000–22 000]** casos de nuevas infecciones por el VIH en niños en el año 2015.
 - Desde 2010, se ha observado un descenso de un **26%** en la cifra de nuevas infecciones por el VIH en niños en esta región.

África oriental y meridional

- En 2015, **19 millones [17,7 millones–20,5 millones]** de personas vivían con el VIH en África oriental y meridional.
 - Las mujeres representan más de la mitad del número total de personas que viven con el VIH en esta región.
- Se calcula que, en 2015, se registraron aproximadamente **960 000 [830 000 – 1,1 millones]** nuevas infecciones por el VIH en África oriental y meridional.
 - Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un **14%**.
 - La región de África oriental y meridional registra un **46%** del total de casos de nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial.
- En África oriental y meridional, **470 000 [390 000–560 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un **38%**.
- En África oriental y meridional, **10,3 millones** de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica, lo que constituye el **54% [50-58%]** de todas las personas que viven con el VIH en la región.
 - En 2015, **el 59% [55%-64%]** de las mujeres adultas (de 15 años o más) y el **44% [41-48%]** de los hombres adultos tenían acceso a la terapia antirretrovírica en África oriental y meridional.
 - **Seis de cada 10 personas** bajo terapia antirretrovírica viven en esta región.
- En 2015, se registraron **56 000 [40 000–76 000]** nuevas infecciones por el VIH en niños en África oriental y meridional.
 - Desde 2010, se ha observado un descenso de un **66%** en la cifra de nuevas infecciones por el VIH en niños en esta región.

Europa oriental y Asia central

- En 2015, **1,5 millones [1,4 millones–1,7 millones]** de personas vivían con el VIH en Europa oriental y Asia central.
- En 2015, se dieron aproximadamente **190 000 [170 000–200 000]** nuevas infecciones por el VIH en la región.

- Entre 2010 y 2015, los casos de **nuevas infecciones por el VIH aumentaron en un 57%**.
- En Europa oriental y Asia central, **47 000 [39 000–39 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
- Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región aumentó en un 22%.
- La cobertura del tratamiento en Europa oriental y Asia central fue de un **21% [20%–23%]** con respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región.
- En Europa oriental y Asia central, se dieron menos de **1000 [<1000–1100]** casos de nuevas infecciones por el VIH en niños en el año 2015.

América Latina y el Caribe

- En 2015, **2 millones [1,7 millones–2,3 millones]** de personas vivían con el VIH en América Latina.
- En 2015, se dieron aproximadamente **100 000 [86 000–120 000]** nuevas infecciones por el VIH en la región.
 - La cifra de nuevas infecciones por el VIH no sufrió ningún cambio entre 2010 y 2015.
- En América Latina, **50 000 [41 000–59 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un 18%.
- La cobertura del tratamiento en América Latina en 2015 fue de un **55% [47%–64%]** con respecto a todas las personas que viven con el VIH en dicha región.
- En América Latina, se dieron **2100 [1600–2900]** casos de nuevas infecciones por el VIH en niños en el año 2015.

Oriente Medio y África septentrional

- In 2015, **230 000 [160 000–330 000]** personas vivían con el VIH en Oriente Medio y África septentrional.
- In 2015, se dieron aproximadamente **21 000 [12 000–37 000]** nuevas infecciones por el VIH en la región.
 - Entre 2010 y 2015, los casos de **nuevas infecciones por el VIH aumentaron en un 4%**.
- En Oriente Medio y África septentrional, **12 000 [8700–16 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, **el número de muertes relacionadas con el sida en la región aumentó en un 22%**.
- La cobertura del tratamiento en 2015 fue de un **17% [12%–24%]** con respecto a todas las personas que viven con el VIH en Oriente Medio y África septentrional.
- En 2015, se registraron **2100 [1400–3200]** nuevas infecciones por el VIH en niños en Oriente Medio y África septentrional.

África occidental y central

- En 2015, **6,5 millones [5,3 millones–7,8 millones]** de personas vivían con el VIH en África occidental y central.
 - Las mujeres representan aproximadamente el 60% del número total de personas que viven con el VIH en esta región.
- Se calcula que, en 2015, se registraron aproximadamente **410 000 [310 000 – 530 000]** nuevas infecciones por el VIH en África occidental y central.
 - Entre 2010 y 2015, los casos de nuevas infecciones por el VIH descendieron en un **8%**.
- En África occidental y central, **330 000 [250 000–430 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región disminuyó en un **10%**.
- En África occidental y central, 1,8 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica, lo que constituye el **28% [23-34%]** de todas las personas que viven con el VIH en la región.
- En 2015, se registraron **66 000 [47 000–87 000]** nuevas infecciones por el VIH en niños en África occidental y central.
 - Desde 2010, se ha observado un descenso de un **31%** en la cifra de nuevas infecciones por el VIH en niños en esta **región**.

América del Norte y Europa occidental y central

- En 2015, **2,4 millones [2,2 millones–2,7 millones]** de personas vivían con el VIH en América del Norte y Europa occidental y central.
- In 2015, se dieron aproximadamente **91 000 [89 000–97 000]** nuevas infecciones por el VIH en la región.
- En América del Norte y Europa occidental y central, **22 000 [20 000–24 000]** personas fallecieron por causas relacionadas con el sida en 2015.
 - Entre 2010 y 2015, el número de muertes relacionadas con el sida en la región descendió en un **24%**.

Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015/(2016*)
Personas que viven con el VIH	28.9 millones [26.5 millones– 31.7 millones]	31.8 millones [29.4 millones– 34.5 millones]	33.3 millones [30.8 millones– 36.1 millones]	33.9 millones [31.4 millones– 36.7 millones]	34.5 millones [31.9 millones– 37.4 millones]	35.2 millones [32.6 millones– 38.1 millones]	35.9 millones [33.3 millones– 38.9 millones]	36.7 millones [34.0 millones– 39.8 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (total)	3.2 millones [2.9 millones– 3.5 millones]	2.5 millones [2.3 millones– 2.8 millones]	2.2 millones [2.0 millones– 2.5 millones]	2.2 millones [1.9 millones– 2.5 millones]	2.2 millones [1.9 millones– 2.4 millones]	2.1 millones [1.9 millones– 2.4 millones]	2.1 millones [1.9 millones– 2.4 millones]	2.1 millones [1.8 millones– 2.4 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (15+ años)	2.7 millones [2.5 millones– 3.0 millones]	2.1 millones [1.9 millones– 2.3 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.1 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.2 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.2 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.2 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.2 millones]	1.9 millones [1.7 millones– 2.2 millones]
Nuevas infecciones (0-14 años)	490 000 [430 000– 560 000]	450 000 [390 000– 510 000]	290 000 [250 000– 350 000]	270 000 [220 000– 330 000]	230 000 [190 000– 290 000]	200 000 [160 000– 250 000]	160 000 [130 000– 220 000]	150 000 [110 000– 190 000]
Muertes relacionadas con el sida	1.5 millones [1.3 millones– 1.8 millones]	2.0 millones [1.7 millones– 2.3 millones]	1.5 millones [1.3 millones– 1.7 millones]	1.4 millones [1.2 millones– 1.7 millones]	1.4 millones [1.2 millones– 1.6 millones]	1.3 millones [1.1 millones– 1.5 millones]	1.2 millones [990 000– 1.4 millones]	1.1 millones [940 000– 1.3 millones]
Personas con acceso al tratamiento	770 000 [680 000– 800 000]	2.2 millones [1.9 millones– 2.2 millones]	7.5 millones [6.6 millones– 7.8 millones]	9.1 millones [8.0 millones– 9.5 millones]	11 millones [9.6 millones– 11.4 millones]	13 millones [11.4 millones– 13.5 millones]	15 millones [13.2 millones– 15.6 millones]	18.2 millones [16.1 millones– 19.0 millones] (*junio de 2016) 17 millones [15.0 millones– 17.7 millones] (final de 2015)
Recursos disponibles para el VIH en países de ingresos medios y bajos	4 800 millones	9 400 millones	15 900 millones	18 300 millones	19 500 millones	19 600 millones	19 200 millones	19 000 millones

Datos regionales — 2015

Región	Personas que viven con el VIH (total)	Nuevas infecciones por el VIH			Muertes relacionadas con el sida (total)	Número total de personas con acceso a la terapia antirretrovírica
		Total	15+ años	0-14 años		
África oriental y meridional	19 millones [17,7 millones–20,5 millones]	960 000 [830 000–1,1 millones]	910 000 [790 000–1,1 millones]	56 000 [40 000–76 000]	470 000 [390 000–560 000]	10 millones
América Latina y el Caribe	2 millones [1,7 millones–2,3 millones]	100 000 [86 000–120 000]	100 000 [84 000–120 000]	2100 [1600–2900]	50 000 [41 000–59 000]	1,1 millones
África occidental y central	6,5 millones [5,3 millones–7,8 millones]	410 000 [310 000–530 000]	350 000 [270 000–450 000]	66 000 [47 000–87 000]	330 000 [250 000–430 000]	1,8 millones
Asia y el Pacífico	5,1 millones [4,4 millones–5,9 millones]	300 000 [240 000–380 000]	280 000 [220 000–350 000]	19 000 [16 000 – 21 000]	180 000 [150 000–220 000]	2,1 millones
Europa oriental y Asia central	1,5 millones [1,4 millones–1,7 millones]	190 000 [170 000–200 000]	190 000 [170 000–200 000]	---*	47 000 [39 000–55 000]	320 000
Oriente Medio y África septentrional	230 000 [160 000–330 000]	21 000 [12 000–37 000]	19 000 [11 000–34 000]	2100 [1400–3200]	12 000 [8700–16 000]	38 000
América del Norte y Europa occidental y central	2,4 millones [2,2 millones–2,7 millones]	91 000 [89 000–97 000]	91 000 [88 000–96 000]	---*	22 000 [20 000–24 000]	1,4 millones

* Estimaciones no están disponibles

Terapia antirretrovírica a nivel regional—2015

	Porcentaje de adultos (15+ años) que viven con el VIH y tienen acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de niños (0-14 años) que viven con el VIH y tienen acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de embarazadas con acceso a antirretrovíricos para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH
África oriental y meridional	53% [50–57%]	63% [56–71%]	90% [82–>95%]
América Latina y el Caribe	55% [47–64%]	64% [54–76%]	88% [77–>95%]
África occidental y central	29% [24–35%]	20% [16–25%]	48% [40–58%]
Asia y el Pacífico	41% [35–47%]	41% [30–37%]	39% [34–44%]
Europa oriental y Asia central	21% [19–22%]	---	---
Oriente Medio y África septentrional	16% [12–24%]	20% [16–25%]	12% [9–18%]
América del Norte y Europa occidental y central	59% [56–68%]	>95% [92–>95%]	92% [87–>95%]
Mundial	46% [43–50%]	49% [42–55%]	77% [69–86%]

* Estimaciones no están disponibles

Contacto

Comunicaciones y Promoción Mundial | +41 79 514 68 96 | communications@unaids.org

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acceda a más información en unaids.org y conecte con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.