

Consejería de Sanidad y Dependencia

Edita: Dirección General de Salud Pública

Semana 16. Año 2010.

Ejemplar gratuito

VIGILANCIA DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO (I.V.E.) EN EXTREMADURA. AÑOS 1999-2009

AUTORES: Manuel Pozzati Piñol, Carmen Rojas Fernández, María del Mar Álvarez Díaz
Subdirección de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud.

1. INTRODUCCIÓN

En el actual informe, al igual que en años anteriores, se presenta la situación de las I.V.E.s en Extremadura para el año 2009.

Desde la Orden Ministerial de 16 de Junio, se inicia en 1986 el Registro de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) en España y la posterior regulación de las mismas en la Comunidad Autónoma de Extremadura iniciada en 1999, a través de la Consejería de Bienestar Social, hoy Consejería de Sanidad y Dependencia y en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Política Social y la **Ley Orgánica 9/1985 del 5 de Julio (B.O.E. nº 166 del 12 de Julio de 1985)**, que modificó el artículo 417 bis del Código Penal, despenalizando parcialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

El objetivo de este trabajo es describir el patrón epidemiológico, características sociales, culturales y sanitarias, de las I.V.E.s practicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2009.

2. MATERIAL Y MÉTODO

En el estudio se han analizado las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2009.

Los casos registrados se refieren a todas las mujeres a las que se les ha practicado una I.V.E. en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sean residentes o no en Extremadura, de otras comunidades autónomas o país de residencia.

Para el cálculo de las tasas específicas hemos utilizado la población del Censo del 2001 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio se realiza a las mujeres entre 10 y 49 años, ya que la edad menor de una mujer a la que se le ha practicado una IVE registrada en Extremadura es de 13 años y la edad mayor es la de 49 años.

3. RESULTADOS


En la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2009 se han practicado 1.868 I.V.E.s, de las cuales 1.065 (57,01%) fueron mujeres residentes en Extremadura, 723 (38,70%) fueron mujeres residentes en el extranjero, principalmente en Portugal y 80 residentes en otras comunidades autónomas (4,28%) (tabla 1).

Tabla 1.- Distribución de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según lugar de residencia. Años 1999-2009.

Años	Total	Lugar de residencia					
		Extremadura		Extranjero		Otras CCAA	
		Casos	%	Casos	%	Casos	%
1999	825	532	64,48%	283	34,30%	10	1,21%
2000	916	675	73,69%	227	24,78%	14	1,53%
2001	1.004	597	59,46%	398	39,64%	9	0,90%
2002	1.212	594	49,01%	611	50,41%	7	0,58%
2003	1.325	633	47,77%	678	51,17%	14	1,06%
2004	1.952	901	46,16%	1.036	53,07%	1	0,05%
2005	2.031	924	45,49%	1.074	52,88%	32	1,58%
2006	2.644	938	35,48%	1.650	62,41%	55	2,08%
2007	2.737	991	36,21%	1.690	61,75%	56	2,05%
2008	1.920	1.109	57,76%	747	38,91%	64	3,33%
2009	1.868	1.065	57,01%	723	38,70%	80	4,28%
Total	18.434	8.959	48,60%	9.117	49,46%	342	1,86%


Las I.V.E.s practicadas en Extremadura de 1999 a 2007 ambos inclusive presentan una tendencia ascendente fundamentalmente debido al aumento de las I.V.E.s practicadas a mujeres residentes en el extranjero. A partir del 2008 la tendencia se estabiliza al disminuir el porcentaje en éstas últimas (tabla 1 y figura 1).

Figura 1.- Número de I.V.E.s realizadas anualmente en Extremadura, según lugar de residencia de la mujer. Años 1999-2009.



También se observa un cambio considerable en la tendencia de las I.V.E.s practicadas a mujeres residentes en otras comunidades autónomas a partir del año 2005, llegando casi a triplicar el nº de casos al final del periodo (tabla 1 y figura 2).

Figura 2.- Evolución de las I.V.E.s en Extremadura. Residentes en otras Comunidades Autónomas. Años 1999-2009




Según la edad de la mujeres a la que se le practica la I.V.E., el grupo de edad con mayor frecuencia registrada es el de 25 a 29 años, presentando 463 interrupciones que suponen un 24,79% con respecto al total de I.V.E.s realizadas en Extremadura en 2009 (tabla 2 y figura 3).

Tabla 2.- Distribución porcentual según grupo de edad de las mujeres a las que se le ha practicado una I.V.E. en Extremadura. Año 2009.

Grupo de edad	Lugar de residencia			Total
	Extremadura	Extranjero	Otras CCAA	
< 15 años	0,56%	0,00%	0,97%	0,70%
15-19 años	0,66%	0,00%	0,83%	0,70%
20-24 años	17,75%	6,25%	13,28%	15,52%
25-29 años	26,48%	30,00%	21,72%	24,79%
30-34 años	22,16%	25,00%	20,19%	21,52%
35-39 años	14,08%	13,75%	22,41%	17,29%
40-44 años	12,77%	21,25%	13,97%	13,60%
> 44 años	5,54%	3,75%	6,64%	5,89%
Casos totales	1065	723	80	1868

Figura 3.- Distribución porcentual de I.V.E. según grupo de edad y lugar de residencia. Año 2009.




La tasa de incidencia acumulada anual de las I.V.E.s practicadas a mujeres residentes en Extremadura en el 2009 ha sido de 3,69 por mil mujeres, presentando una línea ascendente en los últimos años y siendo el 2008 el año con mayor tasa, la tasa de incidencia acumulada media del periodo de estudio fue de 2,82 por mil mujeres (tabla 3 y figura 4).

Tabla 3.- Tasas de incidencia acumulada por grupos de edad de I.V.E.s practicadas a mujeres residentes en Extremadura por mil mujeres. Años 1999-2009.


Grupo de edad	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total periodo
< 15 Años	0,06	0,03	0,00	0,25	0,06	0,06	0,13	0,13	0,09	0,19	0,19	0,13
15-19 Años	3,09	3,61	4,02	4,23	3,76	5,30	5,25	5,57	5,89	5,95	0,20	5,21
20-24 Años	3,86	5,46	4,10	4,31	3,97	6,17	6,70	5,86	6,94	8,80	4,97	6,79
25-29 Años	2,45	2,81	2,27	2,81	3,73	4,82	4,72	5,81	5,19	6,18	7,35	5,35
30-34 Años	2,20	2,60	2,25	1,80	2,23	2,98	3,39	3,57	3,64	3,92	5,97	3,84
35-39 Años	1,61	2,07	2,10	1,51	1,88	2,97	2,58	2,39	3,00	2,83	3,66	2,96
40-44 Años	0,78	1,22	1,08	0,92	1,08	1,52	1,60	1,41	1,35	1,46	3,68	1,79
> 44 Años	0,03	0,03	0,03	0,07	0,10	0,03	0,17	0,21	0,21	0,07	2,06	0,34
Total	1,84	2,34	2,07	2,06	2,19	3,12	3,20	3,25	3,43	3,84	3,69	3,45

Figura 4.- Tasas de I.V.E. practicadas a mujeres residentes en Extremadura. Años 1999-2009.



De las I.V.E.s practicadas a mujeres con residencia habitual en Extremadura en el año 2009, la provincia de Badajoz es la que presenta mayor número de casos, con un 78,97%, mientras que Cáceres presenta el 21,03% (figura 5).

Figura 5.- Distribución porcentual de I.V.E.s practicadas según provincia de residencia. Año 2009.



El método utilizado en la práctica totalidad de las I.V.E.s registradas en el 2009 ha sido el método de aspiración o miniaspiración, llevando a cabo tan sólo un caso por dilatación.

El motivo de las interrupciones en el total de las I.V.E.s ha sido la salud materna.

Patrón socio-cultural de las mujeres a las que se les ha practicado la IVE en Extremadura. Año 2009.

Atendiendo a las características socioculturales de las mujeres a las que se les ha practicado un IVE en Extremadura, independientemente de su residencia, obtenemos los siguientes resultados:

- Un 70,12% están solteras y un 55,40% no convive en pareja (tablas 4 y 5).
- El 32,65% de las mujeres presentan un nivel de instrucción de primer ciclo de enseñanza obligatoria, y un 30,78% de segundo ciclo (tabla 6).
- La situación laboral más frecuente es la de asalariada con un 50,10% del total. La situación laboral de la pareja o cónyuge más frecuente también es asalariado con un 62,47% (tablas 7 y 8).
- Un 60,11% no había acudido a ningún Centro o Servicio Sanitario público o privado para la información de utilización o control de métodos anticonceptivos en los dos últimos años, mientras que un 30,94% acudió a un centro público (tabla 9).
- El 51,07 % no tiene ningún hijo (tabla 10).

- El 70,55 % es la primera vez que se le realiza una I.V.E. (tabla 11)

Por tanto, el patrón de mujer a la que se le practica una IVE en Extremadura es la de una mujer del grupo de edad de 25 a 29 años, sin cargas familiares, que vive sin pareja, asalariada, con unos estudios de primer grado de secundaria, sin abortos anteriores ni hijos y que ha recibido poca o ninguna información en Centro o Servicio Sanitario público o privado sobre la utilización o control de métodos anticonceptivos.

Patrón socio-cultural de las mujeres residentes en Extremadura a las que se les ha practicado una I.V.E. en Extremadura en el año 2009.

- Un 72,76% están solteras y un 58,21% no convive en pareja (tablas 4 y 5).
- El 34,55% de las mujeres presentan un nivel de instrucción correspondiente al primer ciclo de segundo grado de enseñanza obligatoria (tabla 6).
- La situación laboral más frecuente es la de asalariada con un 44,22% del total, al igual que en el caso de la pareja o cónyuge, que también es asalariado con un 61,78% (tablas 7 y 8).
- Un 72,48% no había acudido a ningún Centro o Servicio Sanitario público o privado para la información de utilización o control de métodos anticonceptivos en los dos últimos años (tabla 9).
- El 54,08% no tiene ningún hijo (tabla 10).
- El 69,57% es la primera vez que se le realiza una I.V.E. (tabla 11).

El patrón de mujer a la que se realiza una IVE con residencia habitual en Extremadura es la de una mujer del grupo de edad de 25 a 29 años, sin cargas familiares, que vive sin pareja, asalariada, con unos estudios de primer ciclo de segundo grado, sin abortos anteriores ni hijos y que no ha recibido ninguna información en Centro o Servicio Sanitario público o privado sobre la utilización o control de métodos anticonceptivos.

Patrón socio-cultural de las mujeres con residencia fuera de Extremadura (otras Comunidades Autónomas y extranjero) a las que se les ha practicado una I.V.E. en Extremadura en el año 2008.

- Un 66,62% están solteras y un 51,68% no convive en pareja (tablas 4 y 5).

- El 34,62% de las mujeres presentan un nivel de instrucción de segundo ciclo de enseñanza obligatoria (tabla 6).
- La situación laboral más frecuente es la de asalariada con un 57,90% del total. La situación laboral más frecuente de la pareja o cónyuge también es asalariado con un 63,38% (tablas 7 y 8).
- Un 43,71% no había acudido a ningún Centro o Servicio Sanitario público o privado para la información de utilización o control de métodos anticonceptivos en los dos últimos años (tabla 9).

- El 47,07% no tiene ningún hijo (tabla 10).
- El 71,85% es la primera vez que se le realiza una I.V.E. (tabla 11).

El patrón de mujer a la que se realiza una IVE con residencia habitual en Portugal es la de una mujer del grupo de edad de 25-29 años, soltera, sin cargas familiares, que vive en pareja, asalariada, con unos estudios de segundo grado, sin abortos anteriores ni hijos y que no ha recibido ninguna información en Centro o Servicio Sanitario público o privado sobre la utilización o control de métodos anticonceptivos.

Tabla 4.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según estado civil de la embarazada. Año 2009.

Estado civil	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
Soltera	775 (72,76%)	535 (66,62%)	1310 (70,12%)
Casada	200 (18,77%)	173 (21,54%)	373 (19,96%)
Viuda	4 (0,37%)	5 (0,62%)	9 (0,48%)
Divorciada	38 (3,56%)	55 (6,84%)	93 (4,97%)
Separada	48 (4,50%)	35 (4,35%)	83 (4,44%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 5.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según la convivencia en pareja de la embarazada. Año 2009.

¿Convive en pareja?	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
Sí	445 (41,78%)	388 (48,31%)	833 (44,59%)
No	620 (58,21%)	415 (51,68%)	1035 (55,40%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 6.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según nivel de instrucción de la embarazada. Año 2009.

Nivel de instrucción	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
Analfabeta	4 (0,37%)	2 (0,24%)	6 (0,32%)
Sin estudios	11 (1,03%)	(0%)	11 (0,58%)
Primer grado	269 (25,25%)	125 (15,56%)	394 (21,09%)
Segundo grado, primer ciclo	368 (34,55%)	242 (30,13%)	610 (32,65%)
Segundo grado, segundo ciclo	297 (27,88%)	278 (34,62%)	575 (30,78%)
Tercer grado (Escuela Universitaria)	71 (6,66%)	28 (3,48%)	99 (5,29%)
Tercer grado (Facultad)	43 (4,03%)	127 (15,81%)	170 (9,10%)
No clasificables	2 (0,18%)	1 (0,12%)	3 (0,16%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 7.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según situación laboral de la embarazada. Año 2009.

Situación laboral	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
Profesional que emplea personal	24 (2,25%)	28 (3,48%)	52 (2,78%)
Profesional que no emplea personal	36 (3,38%)	27 (3,36%)	63 (3,37%)
Asalariado/a	471 (44,22%)	465 (57,90%)	936 (50,10%)
Pensionista	3 (0,28%)	2 (0,24%)	5 (0,26%)
Estudiante	167 (15,68%)	121 (15,06%)	288 (15,41%)
Parado/a	336 (31,54%)	147 (18,30%)	483 (25,85%)
Sus labores	26 (2,44%)	12 (1,49%)	38 (2,03%)
Otras	2 (0,18%)	1 (0,12%)	3 (0,16%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 8.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según situación laboral de la pareja de la embarazada. Año 2009.

Situación laboral	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
No existe	116 (10,89%)	129 (16,06%)	245 (13,11%)
Profesional que emplea personal	44 (4,13%)	37 (4,60%)	81 (4,33%)
Profesional que no emplea personal	30 (2,81%)	19 (2,36%)	49 (2,62%)
Asalariado/a	658 (61,78%)	509 (63,38%)	1167 (62,47%)
Pensionista	62 (5,82%)	24 (2,98%)	86 (4,60%)
Estudiante	4 (0,37%)	6 (0,74%)	10 (0,53%)
Parado/a	59 (5,53%)	23 (2,86%)	82 (4,38%)
Sus labores	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Otras	21 (1,97%)	11 (1,36%)	32 (1,71%)
No consta	71 (6,66%)	45 (5,60%)	116 (6,20%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 9.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según lugar donde ha acudido para la utilización o control de métodos anticonceptivos en los dos últimos años. Año 2009.

¿Ha acudido?	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
Sí. Público	239 (22,44%)	339 (42,21%)	578 (30,94%)
Sí. Privado	28 (2,62%)	101 (12,57%)	129 (6,90%)
Sí. Otros	26 (2,44%)	12 (1,49%)	38 (2,03%)
No	772 (72,48%)	351 (43,71%)	1123 (60,11%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 10.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según número de hijos que viven. Año 2009.

Nº hijos	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
0	576 (54,08%)	378 (47,07%)	954 (51,07%)
1	220 (20,65%)	211 (26,27%)	431 (23,07%)
2	172 (16,15%)	153 (19,05%)	325 (17,39%)
3	68 (6,38%)	46 (5,72%)	114 (6,10%)
4	18 (1,69%)	13 (1,61%)	31 (1,65%)
≥ 5	11 (1,03%)	2 (0,24%)	13 (0,69%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

Tabla 11.- Distribución porcentual de las I.V.E.s realizadas en Extremadura según número de abortos voluntarios anteriores al actual. Año 2009.

Nº abortos	Lugar de residencia		
	Extremadura	Otros	Total
0	741 (69,57%)	577 (71,85%)	1318 (70,55%)
1	236 (22,15%)	186 (23,16%)	422 (22,59%)
2	66 (6,19%)	32 (3,98%)	98 (5,24%)
3	11 (1,03%)	7 (0,87%)	18 (0,96%)
4	5 (0,46%)	1 (0,12%)	6 (0,32%)
≥ 5	6 (0,56%)	0 (0%)	6 (0,32%)
casos totales	1065 (57,01%)	803 (42,98%)	1868 (100%)

4. DISCUSIÓN

Las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Extremadura tienen una tendencia descendente respecto a los años anteriores y la edad ha aumentado con respecto al año anterior, pero manteniéndose en el rango etario de 25 a 29 años para el total de las I.V.E.s realizadas.

Las características socio-culturales de las mujeres a las que se les ha realizado una I.V.E. con residencia habitual en Extremadura y residencia en otras comunidades o en el extranjero es muy similar y coincide con el patrón de los años anteriores.

Enfermedades de Declaración Obligatoria. Semana 1-16. Año 2010.

ÁREA DE SALUD	ENFERMEDAD	Casos	ÁREA DE SALUD	ENFERMEDAD	Casos
BADAJOZ	Gripe	993	CACERES	Gripe	808
	TBC respiratoria	11		TBC respiratoria	1
	Varicela	109		Varicela	52
	Sífilis	4		Hidatidosis	2
	Infección Gonocócica	1		Sífilis	4
	Hepatitis C	2		Infección Gonocócica	1
MÉRIDA	Gripe	560	CORIA	Parotiditis	4
	TBC respiratoria	5		Leishmania	1
	Varicela	198		Hepatitis B	1
	Hidatidosis	1		TBC Otras localizaciones	1
	Enfermedad Meningocócica	1		Gripe	411
	Parotiditis	1		Varicela	8
DON BENITO- VILLANUEVA	Hepatitis B	5	PLASENCIA	Infección Gonocócica	1
	TBC Otras localizaciones	1		Gripe	334
	Hepatitis C	2		TBC respiratoria	2
	Gripe	341		Varicela	195
	TBC respiratoria	3		Sífilis	1
	Varicela	56		Infección Gonocócica	1
LLERENA- ZAFRA	Carbunco	1	NAVALMORAL	Enfermedad Meningocócica	1
	Hidatidosis	2		Hepatitis B	1
	Infección Gonocócica	1		Hepatitis Vírica, Otras	2
	Hepatitis B	2		Gripe	85
	Neumococo	1		Varicela	84
	Gripe	838		DE LA MATA	Hidatidosis
LLERENA- ZAFRA	TBC respiratoria	3	DE LA MATA	Infección Gonocócica	1
	Varicela	187		Enfermedad Meningocócica	1
	Sífilis	1			
	Enfermedad Meningocócica	2			

Sistema de Información microbiológica. Sensibilidad/Resistencia antimicrobianos. Semana 16.

Patógeno	Antibiótico	Total	Sensible	% S	Intermedia	% I	Resistente	% R	No Consta	%
Campylobacter yeyuni	Eritromicina	38	37	97,37%	0	0,00%	1	2,63%	0	0,00%
Campylobacter spp.	Eritromicina	11	11	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Listeria monocytogenes	Ampicilina	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Cotrimoxazol									
	Gentamicina									
Mycobacterium tuberculosis	Estreptomina	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Etambutol	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Isoniacida	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Pirazinamida	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Rifampicina	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Ciprofloxacino	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Penicilina	1	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%
Salmonella grupo C	Ampicilina	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Cefotaxima	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Ciprofloxacino	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Cotrimoxazol	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Salmonella grupo B	Ampicilina	21	6	28,57%	0	0,00%	15	71,43%	0	0,00%
	Cefotaxima	21	20	95,24%	0	0,00%	0	0,00%	1	4,76%
	Ciprofloxacino	21	21	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Cotrimoxazol	21	12	57,14%	0	0,00%	2	9,52%	7	33,33%
Salmonella grupo D	Ampicilina	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	0	0,00%
	Cefotaxima	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Ciprofloxacino	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Cotrimoxazol	1	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
Salmonella spp	Ampicilina	35	16	45,71%	0	0,00%	18	51,43%	1	2,86%
	Cefotaxima	31	31	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Ciprofloxacino	29	26	89,66%	0	0,00%	3	10,34%	0	0,00%
	Cotrimoxazol	33	29	87,50%	0	0,00%	4	12,12%	0	0,00%
Streptococcus pneumoniae	Cefotaxima	14	14	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Eritromicina	15	14	93,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	6,67%
	Penicilina	16	13	81,25%	1	6,25%	1	6,25%	1	7,14%
	Vancomicina	15	15	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Sistema de información microbiológica. Aislamientos semanas 13-16

Microorganismo	semana 13	semana 14	semana 15	semana 16	Total
Adenovirus 40/41	1	0	0	0	1
Bacilo ácido alcohol resistente	2	1	1	0	4
Campilobacter jejuni	3	1	1	3	8
Campilobacter spp.	0	0	0	2	2
Cryptosporidium	0	0	2	2	4
Giardia lamblia	0	0	1	2	3
H.I.V.	0	0	2	1	3
Haemophilus influenzae	0	0	0	0	0
Mycobacterium tuberculosis complejo	1	0	0	1	2
Neisseria gonorrhoeae	0	0	0	1	1
Neisseria meningitidis	0	0	0	0	0
Rotavirus	3	8	2	5	18
Salmonella Grupo B	0	0	0	2	2
Salmonella spp.	0	1	0	1	2
Trichomonas vaginalis	0	0	1	0	1
Virus respiratorio sincitial	3	0	1	0	4
Yersinia enterocolitica	0	0	0	1	1

Dirección de envío de originales y de suscripciones. La suscripción es gratuita.

Dirección General de Salud Pública.

Subdirección de Epidemiología. Avenida de las Américas, 2. 06800 Mérida (Badajoz)

Tlfs.: 924 00 43 63 - 924 00 43 62 Fax: 924 00 49 46

Depósito Legal:BA-383-98

ISSN:1139-6199