

### Boletín epidemiológico semanal de Extremadura.

#### Año 2016. Semana 45.

Edita: Dirección General de Salud Pública.

Elabora. Subdirección de Epidemiología.

Servicio Extremeño de Salud.

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Junta de Extremadura. **Depósito legal:** BA-000615-2016.

#### Contenido:

- Situación de la tuberculosis en Extremadura (parte IV).
- Situación de las EDO en la semana del informe, en Extremadura y por Áreas de Salud.

#### Situación de la tuberculosis en Extremadura (parte IV).

Amelia Fuentes Sánchez, Carmen Serrano Martín, Beatriz Caleya Olivas, Alejandro Mateo Cotera, Julián-Mauro Ramos Aceitero.


#### Resultados (IV).

#### 2.- Tuberculosis en otras localizaciones. Evolución histórica.

Si bien con anterioridad se vigilaba la "meningitis tuberculosa", disponemos de datos de otras localizaciones en general desde el año 2003. Históricamente, como es lógico, se aprecia un mayor número de casos de tuberculosis de

localización respiratoria, alrededor del 90 %, oscilando las tuberculosis entre el 3 y el 16 % de los casos totales de tuberculosis declarados anualmente; lo que en números absolutos supone entre 4 y 13 casos anuales.

#### Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015. Localización de la tuberculosis. Porcentajes sobre el total de cada año.



Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015. Localización de la tuberculosis. Porcentajes sobre el total de cada año.

|             | Localización  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | Respiratorias | 137   | 138   | 136   | 119   | 130   | 116   | 100   | 76    | 87    | 71    | 64    | 55    | 60    |
| Casos       | Otras         | 2     | 12    | 8     | 14    | 11    | 10    | 8     | 8     | 14    | 13    | 12    | 10    | 6     |
|             | Total         | 139   | 150   | 144   | 133   | 141   | 126   | 108   | 84    | 101   | 84    | 76    | 65    | 66    |
| Porcentajes | Respiratorias | 98,56 | 92,00 | 94,44 | 89,47 | 92,20 | 92,06 | 92,59 | 90,48 | 86,14 | 84,52 | 84,21 | 84,62 | 90,91 |
|             | Otras         | 1,44  | 8,00  | 5,56  | 10,53 | 7,80  | 7,94  | 7,41  | 9,52  | 13,86 | 15,48 | 15,79 | 15,38 | 9,09  |



Las localizaciones mas frecuentes, sin contar la respiratoria, han venido siendo la genitourinaria, la linfática y la osteoarticular y las localizaciones extrapulmonares sin especificar.

Por área de Salud, en el último quinquenio se aprecia una mayor incidencia de tuberculosis en localizaciones extrapulmonares en el Área de Navalmoral de la Mata, que supera en más del 300% la tasa global de Extremadura en dicho periodo de tiempo.

Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015. Localización en casos de tuberculosis no respiratoria. Número de casos de cada año.

| Localización             | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Meningea                 | 1    | 2    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Sistema nervioso central | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    |
| Digestiva / peritoneal   | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Genitourinaria           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 1    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    |
| Linfática                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 7    | 6    | 5    | 5    | 0    |
| Osteoarticular           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 3    | 3    | 1    | 1    | 2    | 0    |
| Diseminada               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Otras localizaciones     | 0    | 0    | 0    | 1    | 7    | 2    | 4    | 1    | 1    | 3    | 6    | 1    | 4    |
| No consta                | 0    | 10   | 8    | 13   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| Total                    | 2    | 12   | 8    | 14   | 11   | 10   | 8    | 8    | 14   | 13   | 12   | 10   | 6    |

Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015.

Tuberculosis no respiratoria por Área de Salud.

Tasas por millón de habitantes, promedio de la tasa del último quinquenio y razón de tasa del promedio.

| Área                      | 2003 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | Promedio | Razón |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| Badajoz                   | 0,00 | 7,70  | 0,00  | 11,32 | 7,48  | 7,40  | 0,00  | 10,93 | 25,39 | 14,48 | 3,62  | 3,63  | 3,65  | 10,16    | 1,04  |
| Cáceres                   | 5,14 | 25,89 | 5,16  | 10,26 | 20,49 | 10,08 | 15,10 | 5,03  | 10,05 | 5,03  | 20,29 | 10,19 | 10,25 | 11,16    | 1,14  |
| Coria                     | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 20,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  |
| Don Benito-<br>Villanueva | 7,07 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14,09 | 0,00  | 21,06 | 0,00  | 0,00  | 14,01 | 21,12 | 7,09  | 7,14  | 9,87     | 1,01  |
| Llerena-Zafra             | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,88     | 0,19  |
| Mérida                    | 0,00 | 25,18 | 37,79 | 6,23  | 6,16  | 6,03  | 11,96 | 5,94  | 17,72 | 17,65 | 5,86  | 23,51 | 5,92  | 14,13    | 1,45  |
| Navalmoral de la<br>Mata  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18,22 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18,18 | 18,28 | 18,40 | 10,97    | 1,12  |
| Plasencia                 | 0,00 | 8,86  | 8,89  | 62,44 | 8,93  | 44,67 | 0,00  | 26,35 | 8,79  | 26,57 | 17,88 | 0,00  | 0,00  | 10,65    | 1,09  |
| Extremadura               | 1,86 | 11,16 | 7,38  | 12,89 | 10,09 | 9,11  | 7,26  | 7,23  | 12,62 | 11,73 | 10,87 | 8,18  | 5,49  | 9,78     | 1,00  |

Por grupos de edad al diagnóstico, se presenta una gran variabilidad, si bien puede apreciarse un mayor porcentaje de casos en las edades medias de la vida y a partir de los 80 años. De los 14 casos pediátricos (< 15 años de edad), en 6 de ellos (el 42,85 %) la presentación fue meningitis tuberculosa.





#### Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015. Tuberculosis no respiratoria. Casos por grupo de edad y año de declaración.

| Grupo de edad | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-4 años      | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 5-9 años      | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10-14 años    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 15-19 años    | 0    | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    |
| 20-24 años    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 3    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    |
| 25-29 años    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    |
| 30-34 años    | 0    | 2    | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 2    | 0    | 0    |
| 35-39 años    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 3    | 1    |
| 40-44 años    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 45-49 años    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 1    |
| 50-54 años    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 55-59 años    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 4    | 1    | 0    |
| 60-64 años    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 65-69 años    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 70-74 años    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    |
| 75-79 años    | 0    | 2    | 0    | 2    | 1    | 2    | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 80-84 años    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    |
| >85 años      | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 0    | 1    |
| DESCONOCIDA   | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Total anual   | 2    | 12   | 8    | 14   | 11   | 11   | 8    | 12   | 17   | 20   | 16   | 10   | 6    |

#### Tuberculosis en Extremadura. Casos declarados de 2003 a 2015. Tuberculosis no respiratoria por grupo de edad y año de declaración. Porcentajes sobre el total de cada año y promedio del último quinquenio.

| Grupo de<br>edad | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | Promedio quinquenio |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| 0-4 años         | 0,00  | 8,33  | 0,00  | 0,00  | 18,18 | 0,00  | 12,50 | 0,00  | 5,88  | 5,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,18                |
| 5-9 años         | 0,00  | 16,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| 10-14 años       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,09  | 9,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| 15-19 años       | 0,00  | 0,00  | 25,00 | 28,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,88  | 0,00  | 12,50 | 0,00  | 16,67 | 7,01                |
| 20-24 años       | 50,00 | 8,33  | 0,00  | 7,14  | 0,00  | 27,27 | 0,00  | 25,00 | 0,00  | 10,00 | 0,00  | 10,00 | 0,00  | 4,00                |
| 25-29 años       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,14  | 9,09  | 9,09  | 37,50 | 0,00  | 5,88  | 10,00 | 6,25  | 0,00  | 0,00  | 4,43                |
| 30-34 años       | 0,00  | 16,67 | 12,50 | 7,14  | 18,18 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17,65 | 10,00 | 12,50 | 0,00  | 0,00  | 8,03                |
| 35-39 años       | 0,00  | 0,00  | 12,50 | 0,00  | 0,00  | 9,09  | 0,00  | 8,33  | 5,88  | 10,00 | 0,00  | 30,00 | 16,67 | 12,51               |
| 40-44 años       | 50,00 | 8,33  | 0,00  | 7,14  | 0,00  | 0,00  | 12,50 | 8,33  | 0,00  | 5,00  | 0,00  | 0,00  | 16,67 | 4,33                |
| 45-49 años       | 0,00  | 0,00  | 12,50 | 7,14  | 0,00  | 9,09  | 0,00  | 8,33  | 5,88  | 10,00 | 6,25  | 0,00  | 16,67 | 7,76                |
| 50-54 años       | 0,00  | 8,33  | 0,00  | 0,00  | 9,09  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11,76 | 0,00  | 0,00  | 10,00 | 0,00  | 4,35                |
| 55-59 años       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,14  | 0,00  | 0,00  | 12,50 | 0,00  | 0,00  | 5,00  | 25,00 | 10,00 | 0,00  | 8,00                |
| 60-64 años       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,00  | 6,25  | 10,00 | 0,00  | 4,25                |
| 65-69 años       | 0,00  | 0,00  | 25,00 | 0,00  | 9,09  | 9,09  | 12,50 | 25,00 | 5,88  | 5,00  | 6,25  | 0,00  | 0,00  | 3,43                |
| 70-74 años       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,14  | 0,00  | 9,09  | 0,00  | 0,00  | 11,76 | 10,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,35                |
| 75-79 años       | 0,00  | 16,67 | 0,00  | 14,29 | 9,09  | 18,18 | 0,00  | 0,00  | 17,65 | 0,00  | 6,25  | 10,00 | 0,00  | 6,78                |
| 80-84 años       | 0,00  | 0,00  | 12,50 | 7,14  | 18,18 | 0,00  | 12,50 | 16,67 | 5,88  | 10,00 | 6,25  | 20,00 | 16,67 | 11,76               |
| >85 años         | 0,00  | 8,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,33  | 0,00  | 5,00  | 12,50 | 0,00  | 16,67 | 6,83                |
| No consta        | 0,00  | 8,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                |
| Totales          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                 |

(Continúa en el próximo número del Boletín)






#### Sistema EDO. Situación en la semana 45 de 2016.

Se presentan los datos de las EDO de las que se ha notificado algún caso a lo largo del año en curso o del anterior, a efectos de comparación de ambos años; no se incluyen las EDO de las que no se han notificado casos en ambos años, ni las de especial vigilancia, gripe e infección VIH-Sida que tiene su gestión de datos e informe específicos. Del resto de EDO que no aparecen reflejadas no se ha notificado ningún caso.

| Situación de las Enfermeda                    | des de Dec   | laración O        | bligatoria, ei           | n Extrema | dura.   |           |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| Enfermedad                                    |              | clarados<br>emana | Casos acur<br>hasta la s |           | Índice  | epidémico |
|   | 2015         | 2016              | 2015                     | 2016      | Semanal | Acumulado |
| EDO de alta incidencia (r                     | nás de 10 d  | casos/año         | en el último             | año natur | al)     |           |
| Varicela                                      | 43           | 5                 | 1900                     | 584       | 0,14    | 0,29      |
| Campilobacteriosis                            | 3            | 30                | 252                      | 278       | 10,00   | 1,10      |
| Salmonelosis (excluye F. Tif. y Paratifoidea) | 3            | 20                | 232                      | 327       | 6,67    | 1,41      |
| Chlamydia trachomatis                         | 14           | 1                 | 55                       | 70        | nc      | 1,27      |
| Sífilis (excluye sífilis congénita)           | 3            | 4                 | 53                       | 50        | 4,00    | 1,00      |
| Tuberculosis (de cualquier localización)      | 1            | 1                 | 45                       | 70        | 1,00    | 1,21      |
| Tos ferina                                    | 0            | 1                 | 46                       | 33        | nc      | 6,60      |
| Giardiasis                                    | 0            | 0                 | 0                        | 33        | 0,00    | 0,89      |
| Infección Gonocócica                          | 0            | 0                 | 19                       | 41        | 0,00    | 2,16      |
| Herpes zoster                                 | 3            | 20                | 25                       | 202       | 2,00    | 1,26      |
| Parotiditis                                   | 0            | 1                 | 14                       | 52        | nc      | 1,49      |
| Enfermedad Neumocócica Invasora               | 0            | 1                 | 14                       | 35        | nc      | 2,50      |
| Hepatitis C                                   | 0            | 2                 | 13                       | 25        | nc      | 2,08      |
| Criptosporidiosis                             | 0            | 1                 | 11                       | 3         | 0,00    | 0,27      |
| Hepatitis A                                   | 3            | 1                 | 13                       | 21        | nc      | 1,31      |
| EDO de incidencia media (e                    | entre 6 y 10 | casos/añ          | o en el últim            | o año nat | ural)   |           |
| Legionelosis                                  | 0            | 0                 | 8                        | 20        | nc      | 2,22      |
| Yersiniosis                                   | 1            | 0                 | 9                        | 12        | 0,00    | 1,33      |
| Listeriosis                                   | 0            | 0                 | 8                        | 7         | nc      | 0,88      |
| Hidatidosis                                   | 0            | 0                 | 6                        | 8         | nc      | 1,60      |
| Fiebre Exantemática Mediterránea              | 0            | 0                 | 6                        | 1         | nc      | 0,17      |
| EDO de incidencia baja (e                     | ntre 1 y 5   | casos/año         | en el último             | año natui | ral)    |           |
| Infección por E. Coli.                        | 0            | 0                 | 0                        | 2         | nc      | nc        |
| Leptospirosis                                 | 0            | 0                 | 0                        | 1         | 0,00    | 2,00      |
| Shigelosis                                    | 0            | 0                 | 0                        | 1         | nc      | nc        |
| Brucelosis                                    | 0            | 0                 | 1                        | 2         | nc      | 0,29      |
| Enfermedad Meningocócica                      | 0            | 0                 | 1                        | 4         | nc      | 1,00      |
| Enfermedad por virus Chikungunya              | 0            | 0                 | 0                        | 4         | nc      | 4,00      |
| Fiebre Q                                      | 0            | 0                 | 1                        | 3         | nc      | 1,50      |
| Fiebre Tifoidea y Paratifoidea                | 0            | 0                 | 1                        | 1         | nc      | nc        |
| Paludismo                                     | 0            | 0                 | 2                        | 5         | nc      | 1,25      |
| Carbunco                                      | 0            | 0                 | 3                        | 2         | nc      | nc        |
| Enf. invasora por Haemophilus influenzae      | 0            | 0                 | 3                        | 3         | nc      | 1,00      |
| Hepatitis B                                   | 1            | 1                 | 5                        | 13        | nc      | 1,30      |
| Leishmaniasis                                 | 0            | 0                 | 1                        | 2         | nc      | 0,67      |

Notas: - Casos notificados en la semana NO corregidos por retraso de notificación.
- El índice epidémico se calcula sobre la mediana de casos, del periodo, de los cinco años anteriores; en las enfermedades sin datos históricos, se ha calculado directamente sobre los datos del año anterior. Valores superiores a 1 indican incidencia superior a la esperada, y viceversa.







# Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (I). Casos notificados en la semana del informe. (No corregidos por retraso de notificación).

| Enfermedad   | ВА         | сс         | со       | DB        | LL      | ME       | NA | PL | Total<br>C.A. |
|--|------------|------------|----------|-----------|---------|----------|----|----|---------------|
| EDO de alta incidencia   | a (más do  | e 10 caso  | s/año e  | n el últi | mo año  | natural) |    |    |               |
| Varicela   | 0          | 2          | 0        | 0         | 0       | 1        | 2  | 0  | 5             |
| Campilobacteriosis   | 28         | 0          | 0        | 0         | 2       | 0        | 0  | 0  | 30            |
| Salmonelosis (excluye F. Tif. y paratifoidea)                            | 15         | 1          | 0        | 0         | 1       | 0        | 0  | 3  | 20            |
| Chlamydia trachomatis  | 1          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| Sífilis (excluye sífilis congénita)                                      | 0          | 1          | 0        | 0         | 0       | 3        | 0  | 0  | 4             |
| Tuberculosis (de cualquier localización)                                 | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 1        | 0  | 0  | 1             |
| Tos ferina   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 1        | 0  | 0  | 1             |
| Giardiasis   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Infección Gonocócica   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Herpes zoster  | 0          | 10         | 0        | 0         | 0       | 0        | 2  | 0  | 20            |
| Parotiditis  | 0          | 1          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| Enfermedad Neumocócica Invasora  | 1          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| Hepatitis C  | 0          | 2          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 2             |
| Criptosporidiosis  | 1          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| Hepatitis A  | 1          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| EDO de incidencia media (entre 6 y 10 casos/año en el último año natural |            |            |          |           |         |          |    |    |               |
| Legionelosis   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Yersiniosis  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Listeriosis  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Hidatidosis  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Fiebre Exantemática Mediterránea   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| EDO de incidencia baja   | a (entre : | 1 y 5 case | os/año e | n el últi | imo año | natural  |    |    |               |
| Infección por E. Coli.   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Leptospirosis  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Shigelosis   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Brucelosis   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Enfermedad Meningocócica   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Enfermedad por virus Chikungunya   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Fiebre Q   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Fiebre Tifoidea y Paratifoidea   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Paludismo  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Carbunco   | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Enf. invasora por Haemophilus influenzae                                 | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |
| Hepatitis B  | 1          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 1             |
| Leishmaniasis  | 0          | 0          | 0        | 0         | 0       | 0        | 0  | 0  | 0             |

|                        |                         |                          | _                               |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                        | . 1/6 1 6 1             |                          | ones de Salud de Área del SES:  |
| Listado de niimeros de | ah vet ah v sonotalat i | CONTACTO NO ISC DIFACCIO | anac da Saliid da Araa dal SES. |
|                        |                         |                          |                                 |

| Área     | Badajoz     | Cáceres     | Coria       | Don Benito  | Mérida      | Llerena     | Navalmoral  | Plasencia   |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Teléfono | 924 215 250 | 927 004 203 | 927 149 227 | 924 382 850 | 924 382 435 | 924 029 292 | 927 538 252 | 927 428 368 |
| Fax      | 924 215 218 | 927 004 292 | 927 149 221 | 924 802917  | 924 382 453 | 924 029 196 | 927 538 259 | 927 428 418 |





## Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria por Áreas de Salud (II). Casos ACUMULADOS, notificados en lo que va de año, hasta la semana del informe (Corregidos por retraso de notificación).

| Enfermedad                                    | ВА       | СС         | со       | DB         | LL       | ME        | NA  | PL | Total<br>C.A. |
|---|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----|----|---------------|
| EDO de alta incidencia                        | (más de  | e 10 caso  | s/año e  | n el últii | no año   | natural). |     |    |               |
| Varicela                                      | 45       | 42         | 57       | 17         | 18       | 353       | 5   | 47 | 584           |
| Campilobacteriosis                            | 86       | 41         | 2        | 2          | 46       | 77        | 1   | 23 | 278           |
| Salmonelosis (excluye F. Tif. y paratifoidea) | 63       | 33         | 16       | 38         | 31       | 66        | 6   | 74 | 327           |
| Chlamydia trachomatis                         | 56       | 7          | 1        | 4          | 1        | 0         | 0   | 1  | 70            |
| Sífilis (excluye sífilis congénita)           | 14       | 12         | 0        | 8          | 2        | 13        | 1   | 0  | 50            |
| Tuberculosis (de cualquier localización)      | 24       | 13         | 2        | 5          | 3        | 10        | 2   | 11 | 70            |
| Tos ferina                                    | 10       | 7          | 0        | 4          | 3        | 9         | 0   | 0  | 33            |
| Giardiasis                                    | 7        | 2          | 2        | 6          | 8        | 5         | 0   | 3  | 33            |
| Infección Gonocócica                          | 11       | 16         | 1        | 0          | 2        | 9         | 1   | 1  | 41            |
| Herpes zoster                                 | 21       | 102        | 7        | 10         | 8        | 25        | 12  | 17 | 202           |
| Parotiditis                                   | 10       | 16         | 1        | 0          | 2        | 18        | 2   | 3  | 52            |
| Enfermedad Neumocócica Invasora               | 11       | 2          | 0        | 2          | 1        | 3         | 1   | 15 | 35            |
| Hepatitis C                                   | 6        | 6          | 0        | 4          | 5        | 2         | 0   | 2  | 25            |
| Criptosporidiosis                             | 0        | 1          | 0        | 0          | 1        | 0         | 0   | 1  | 3             |
| Hepatitis A                                   | 6        | 0          | 0        | 0          | 1        | 11        | 2   | 1  | 21            |
| EDO de incidencia media                       | a (entre | 6 y 10 ca  | sos/año  | en el ú    | ltimo añ | o natura  | al) |    |               |
| Legionelosis                                  | 4        | 13         | 0        | 0          | 0        | 1         | 1   | 1  | 20            |
| Yersiniosis                                   | 0        | 6          | 1        | 2          | 0        | 3         | 0   | 0  | 12            |
| Listeriosis                                   | 2        | 3          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 2  | 7             |
| Hidatidosis                                   | 0        | 5          | 1        | 1          | 0        | 1         | 0   | 0  | 8             |
| Fiebre Exantemática Mediterránea              | 0        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 0  | 1             |
| EDO de incidencia baja                        | entre :  | 1 y 5 case | os/año e | n el últi  | imo año  | natural)  |     |    |               |
| Infección por E. Coli.                        | 0        | 2          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 0  | 2             |
| Leptospirosis                                 | 0        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 0  | 1             |
| Shigelosis                                    | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 1  | 1             |
| Brucelosis                                    | 1        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 0  | 2             |
| Enfermedad Meningocócica                      | 1        | 0          | 0        | 0          | 0        | 1         | 0   | 2  | 4             |
| Enfermedad por virus Chikungunya              | 1        | 1          | 0        | 2          | 0        | 0         | 0   | 0  | 4             |
| Fiebre Q                                      | 1        | 0          | 1        | 0          | 1        | 0         | 0   | 0  | 3             |
| Fiebre Tifoidea y Paratifoidea                | 0        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 0  | 1             |
| Paludismo                                     | 2        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0         | 0   | 2  | 5             |
| Carbunco                                      | 0        | 0          | 0        | 2          | 0        | 0         | 0   | 0  | 2             |
| Enf. invasora por Haemophilus influenzae      | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 3         | 0   | 0  | 3             |
| Hepatitis B                                   | 2        | 4          | 1        | 3          | 0        | 2         | 1   | 0  | 13            |
| Leishmaniasis                                 | 0        | 1          | 0        | 0          | 1        | 0         | 0   | 0  | 2             |

### Boletín Epidemiológico Semanal de Extremadura. Depósito legal: BA-000615-2016.

Equipo de redacción: Julián-Mauro Ramos Aceitero, Amelia Fuentes Sánchez, Carmen Serrano Martín, Carmen Rojas Fernández, Beatriz Caleya Olivas. Apoyo administrativo: Estíbaliz Piñero Bautista. Apoyo informático: Cecilia Gordillo Romero.

Servicio Extremeño de Salud. Dirección General de Salud Pública. Subdirección de Epidemiología. Avda. de las Américas, nº 2 – 06800 – Mérida (Badajoz).

Telf.: 924 38 21 73. Fax: 924 38 25 09. Correo-e: vigilancia.epidemiologica@salud-juntaex.es

#### JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

