ESTADÍSTICAS MUNDIALES SOBRE EL VIH

20,9 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en junio de 2017.

36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el mundo.

1,8 millones [1,6 millones–2,1 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.

1 millón [830.000–1,2 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.

76,1 millones [65,2 millones–88,0 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH desde
el comienzo de la epidemia.

35,0 millones [28,9 millones–41,5 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

Personas que viven con el VIH

- En 2016, 36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] de personas vivían con el VIH.
  - 34,5 millones [28,8 millones–40,2 millones] adultos
  - 17,8 millones [15,4 millones–20,3 millones] mujeres (mayores de 15 años)
  - 2,1 millones [1,7 millones–2,6 millones] niños (menores de 15 años)

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica

- A junio de 2017, 20,9 millones [18,4 millones–21,7 millones] de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica, un aumento con relación a los 17,1 millones [15,1 millones–17,8 millones] de 2015 y los 7,7 millones [6,8 millones–8,0 millones] de 2010.
- En 2016, alrededor del 53% [39%–65%] de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento.
  - Aproximadamente el 54% [40%–65%] de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, pero solo el 43% [30%–54%] de los niños de hasta 14 años tuvieron acceso.
- En 2016, alrededor del 76% [60%–88%] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión del VIH a sus hijos.

Nuevas infecciones por el VIH

- A nivel mundial, 1,8 millones [1,6 millones–2,1 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron alrededor de un 11%, desde 1.9 millones [1,6 millones–2,1 millones] hasta 1,7 millones [1,4 millones–1,9 millones] en 2016.
- Las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 47% desde 2010, desde 300.000 [230.000–370.000] en 2010 hasta 160.000 [100.000–220.000] en 2016.

Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en un 48%.
  - En 2016, fallecieron 1 millón [830.000–1,2 millones] de personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1,9 millones [1,7 millones–2,2 millones] de 2005 y los 1,5 millones [1,3 millones–1,7 millones] de 2010.

El VIH y la tuberculosis

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH, y es responsable de aproximadamente una de cada tres muertes relacionadas con el sida.
- En 2015, hubo aproximadamente 10,4 millones de casos de tuberculosis en todo el mundo, donde se incluyen 1,2 millones [11%] de personas que vivían con el VIH.
- Las muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH descendieron un 33% de 2005 a 2015.
  - Sin embargo, aproximadamente un 60% [57%] de los casos de tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH no recibieron ningún diagnóstico o tratamiento, lo que causó 390.000 muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas que vivían con el VIH en 2015.

Inversiones

- A finales de 2016, había 19.100 millones de dólares estadounidenses disponibles para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medios.
- Los recursos nacionales representaron el 57% del total de los recursos destinados al VIH en dichos países en 2016.
- ONUSIDA estima que se necesitarán 26.200 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al sida en 2020 en los países de ingresos bajos y medios, y 23.900 millones de dólares estadounidenses en 2030.

ESTADÍSTICA REGIONALES SOBRE EL VIH EN 2016

África Oriental y Meridional

- En 2016, **19,4 millones** [17,8 millones–21,1 millones] **de personas vivían con el VIH** en África Oriental y Meridional.

- **Las mujeres y las niñas** representan más de la mitad **[59%]** del total de personas que viven con el VIH en África Oriental y Meridional.

- En África Oriental y Meridional se concentra el **43% del número total de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo**.
- En 2016, se produjeron en la región alrededor de **790.000** [710.000–870.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las nuevas **infecciones por el VIH descendieron** un **29%** de 2010 a 2016.
- En África Oriental y Meridional, **420.000** [350.000–510.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un descenso del **42%**.
- En 2016, en África Oriental y Meridional, **11,7 millones** de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica, un **60%** [48%–68%] de todas las personas que vivían con el VIH en la región.
  - El **67%** [54%–76%] de las mujeres adultas (mayores de 15 años) y el **51%** [41%–58%] de los hombres adultos tenían acceso a la terapia antirretrovírica en África Oriental y Meridional en 2016.
  - **Seis de cada diez personas** que reciben terapia antirretrovírica viven en África Oriental y Meridional.
- En 2016, se produjeron **77.000** [52.000–110.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en África Oriental y Meridional.
  - Desde 2010, se ha producido un descenso del **56%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

Asia y el Pacífico

- En 2016, **5,1 millones** [3,9 millones–7,2 millones] de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **270.000** [190.000–370.000] nuevas infecciones por el VIH.
  - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **13%** de 2010 a 2016.
- En Asia y el Pacífico, **170.000** [130.000–220.000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso del 30%**.
- La cobertura del tratamiento llegó al **47%** [31%–69%] de las personas que vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- Aproximadamente **2,4 millones** [2,1 millones–2,5 millones] de personas tuvieron **acceso a la terapia antirretrovírica** en Asia y el Pacífico en 2016.
- En 2016, se produjeron **15.000** [7.700–26.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en Asia y el Pacífico.

- Desde 2010, se ha producido un descenso del **38%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

África Occidental y Central

- En 2016, **6,1 millones** [4,9 millones–7,6 millones] **de personas vivían con el VIH** en África Occidental y Central.
  - **Las mujeres** representan el **56%** del total de personas que viven con el VIH en la región.
- En 2016, se produjeron en la región alrededor de **370.000** [270.000–490.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las **nuevas infecciones por el VIH descendieron** un **9%** de 2010 a 2016.
- En África Occidental y Central, **310.000** [220.000–400.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un **descenso** del **21%**.
- En 2016 en África Occidental y Central, **2,1 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica**, un **35%** [24%–44%] de todas las personas que vivían con el VIH en la región.
- En 2016, se produjeron **60.000** [35.000–89.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en África Occidental y Central.
  - Desde 2010, se ha producido un **descenso del 33% del número de nuevas infecciones por el VIH en niños** en la **región**.

América Latina

- En 2016, **1,8 millones** [1,4 millones–2,1 millones] **de personas vivían con el VIH** en América Latina.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **97.000** [79.000–120.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - El número de nuevas infecciones por el VIH no varió de 2010 a 2016.
- En América Latina, **36.000** [28.000–45.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida**en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, el **número de muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso** del **12%**.
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 llegó al **58%** [42%–72%] de todas las personas que vivían con el VIH en América Latina.
- En 2016, se produjeron **1.800** [1.300–2.400] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en América Latina.

El Caribe

- En 2016, **310.000** [280.000–350.000] personas vivían con el VIH en el Caribe.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **18.000** [15.000–22.000] **nuevas infecciones por el VIH**.

- En 2016, **9.400** [7.300–12.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en el Caribe.
  - Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso** del **28%.**
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 llegó al **52%** [41%–60%] de todas las personas que vivían con el VIH en el Caribe.
- En 2016, se produjeron **menos de 1.000** [<1.000–1.000] **nuevas infecciones por el VIH en niños** en el Caribe.

Oriente Medio y África Septentrional

- En 2016, **230.000** [160.000–380.000] **personas vivían con el VIH** en Oriente Medio y África Septentrional.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **18.000** [11.000–39.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - Las **nuevas infecciones por el VIH descendieron un 4%** de 2010 a 2016.
- En Oriente Medio y África Septentrional, **11.000** [7.700–19.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
  - Entre 2010 y 2016, **el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un aumento del 19%**.
- La **cobertura del tratamiento** en 2016 fue solo del **24%** [15%–41%] de todas las personas que vivían con el VIH en Oriente Medio y África Septentrional.
- En 2016, se produjeron **1.400** [<1.000–3.300] nuevas infecciones por el VIH en niños en Oriente Medio y África Septentrional.

Europa Oriental y Asia Central

- En 2016, **1,6 millones** [1,4 millones–1,7 millones] **de personas vivían con el VIH** en Europa Oriental y Asia Central.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **190.000** [160.000–220.000] **nuevas infecciones por el VIH**.
  - **La cantidad de nuevas infecciones por el VIH ascendió un 60%** de 2010 a 2016.
- En Europa Oriental y Asia Central, **40.000** [32.000–49.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.
- Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **aumento** del **27%**.
- La cobertura del tratamiento llega solo al **28%** [22%–32%] de las personas que viven con el VIH en Europa Oriental y Asia Central.

Europa Occidental y Central, y América del Norte

- En 2016, **2,1 millones** [2 millones–2,3 millones] **de personas vivían con el VIH** en Europa Occidental y Central, y América del Norte.
- En 2016, se produjeron en la región aproximadamente **73.000** [68.000–78.000] **nuevas infecciones por el VIH**.

- En Europa Occidental y Central, y América del Norte, **18.000** [15.000–20.000] personas **fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida** en 2016.

Entre 2010 y 2016, el número de **muertes relacionadas con el sida** en la región experimentó un **descenso** del **32%**.

Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016/ *junio de 2017
Personas que viven con el VIH	**27,7 millones** [23,2 millones–32,3 millones]	**31,0 millones** [26,0 millones–36,3 millones]	**33,2 millones** [27,6 millones–39,2 millones]	**34,3 millones** [28,5 millones–40,3 millones]	**34,9 millones** [29,0 millones–40,9 millones]	**35,5 millones** [29,5 millones–41,6 millones]	**36,1 millones** [30,2 millones–42,2 millones]	**36,7 millones** [30,8 millones–42,9 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (total)	**3,0 millones** [2,6 millones–3,4 millones]	**2,5 millones** [2,2 millones–2,8 millones]	**2,2 millones** [1,9 millones–2,4 millones]	**2,1 millones** [1,8 millones–2,3 millones]	**2,0 millones** [1,7 millones–2,3 millones]	**2,1 millones** [1,9 millones–2,4 millones]	**1,9 millones** [1,6 millones–2,2 millones]	**1,8 millones** [1,6 millones–2,1 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (mayores de 15 años)	**2,5 millones** [2,2 millones–2,9 millones]	**2,1 millones** [1,8 millones–2,3 millones]	**1,9 millones** [1,6 millones–2,1 millones]	**1,8 millones** [1,6 millones–2,0 millones]	**1,8 millones** [1,5 millones–2,0 millones]	**1,7 millones** [1,5 millones–2,20 millones]	**1,7 millones** [1,5 millones–2,0 millones]	**1,7 millones** [1,4 millones–1,9 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (hasta 14 años)	**460.000** [370.000–540.000]	**430.000** [340.000–510.000]	**300.000** [230.000–370.000]	**270.000** [250.000–190.000]	**220.000** [160.000–280.000]	**190.000** [130.000–260.000]	**170.000** [110.000–240.000]	**160.000** [100.000–220.000]
Muertes relacionadas con el sida	**1,5 millones** [1,2 millones–1,8 millones]	**1,9 millones** [1,7 millones–2,2 millones]	**1,5 millones** [1,3 millones–1,7 millones]	**1,3 millones** [1,1 millones–1,5 millones]	**1,2 millones** [1,0 millones–1,4 millones]	**1,1 millones** [940.000–1,3 millones]	**1,1 millones** [880.000–1,3 millones]	**1,0 millones** [830.000–1,2 millones]
Personas con acceso a la terapia antirretrovírica	**685.000** [600.000–710.000]	**2,056 millones** [1,8 millones–2,1 millones]	**7,7 millones** [6,8 millones–8,0 millones]	**11,2 millones** [9,8 millones–11,6 millones]	**13,1 millones** [11,6 millones–13,7 millones]	**15,1 millones** [13,3 millones–15,7 millones]	**17,1 millones** [15,1 millones–17,8 millones]	**19,5 millones** [17,2 millones–20,3 millones] / ***20,9 millones** [18,4 millones–21,7 milliones]
Recursos (en dólares de EE. UU.) disponibles para	**4.800**	**9.400**	**15.900**	**18.800**	**19.500 millones***	**19.200 millones***	**19.000 millones***	**19.100 millones***

* Incluye los países de ingresos bajos y medianos según la clasificación de 2012 del Banco Mundial.
* Incluye los países de ingresos bajos y medianos según la clasificación de 2013 del Banco Mundial.

Datos regionales de 2016

Región	Personas que viven con el VIH (total) 2016	Nuevas infecciones por el VIH 2016			Muertes relacionadas con el sida (total) 2016	Total de personas con acceso a la terapia antirretrovírica 2016	Total de personas con acceso a la terapia antirretrovírica Junio de 2017
		Total	Más de 15 años	Hasta 14 años			
África Oriental y Meridional	**19,4 millones** [17,8 millones–21,1 millones]	**790.000** [710.000–870.000]	**710.000** [630.000–790.000]	**77.000** [52.000–110.000]	**420.000** [350.000–510.000]	**11,7 millones [10,3 millones–12,1 millones]**	**12,5 millones [11,0 millones–13,0 millones]**
Asia y el Pacífico	**5,1 millones** [3,9 millones–7,2 millones]	**270.000** [190.000–370.000]	**250.000** [180.000–380.000]	**15.000** [7.700–26.000]	**170.000** [130.000–220.000]	**2,4 millones [2,1 millones–2,5 millones]**	**2,5 millones [2,2 millones–2,6 millones]**
África Occidental y Central	**6,1 millones** [4,9 millones–7,6 millones]	**370.000** [270.000–490.000]	**310.000** [220.000–410.000]	**60.000** [35.000–89.000]	**310.000** [220.000–400.000]	**2,1 millones [1,9 millones–2,2 millones]**	**2,3 millones [2,0 millones–2,4 millones]**
América Latina	**1,8 millones** [1,4 millones–2,1 millones]	**97.000** [79.000–120.000]	**96.000** [78.000–120.000]	**1.800** [1.300–2.400]	**36.000** [28.000–45.000]	**1,0 millón [896.000–1.059.000]**	**1,1 millones [937 000–1,1 millones]**
El Caribe	**310.000** [280.000–350.000]	**18.000** [15.000–22.000]	**17.000** [14.000–21.000]	**<1.000** [<1.000–1.000]	**9.400** [7.300–12.000]	**162.000 [143.000–169.000]**	**170 000 [150 000–177 000]**
Oriente Medio y África Septentrional	**230.000** [160.000–380.000]	**18.000** [11.000–39.000]	**17.000** [10.000–36.000]	**1.400** [<1.000–3.300]	**11.000** [7.700–19.000]	**54.400 [47.800–56.500]**	**58 400 [51 400–60 700**
Europa Oriental y Asia Central	**1,6 millones** [1,4 millones–1,7 millones]	**190.000** [160.000–220.000]	**190.000** [160.000–220.000]	**—***	**40.000** [32.000–49.000]	**434.000 [382.000–452.000]**	**474 000 [417 000–493 000]**
Europa Occidental y Central, y América del Norte	**2,1 millones** [2 millones–2,3 millones]	**73.000** [68.000–78.000]	**72.000** [67.000–78.000]	**—***	**18.000** [15.000–20.000]	**1,7 millones [1,5 millones–1,7 millones]**	**1,7 millones [1,5 millones–1,8 millones]**

* Las estimaciones no estaban disponibles en el momento de la publicación.

Terapia antirretrovírica por regiones en 2016

	Porcentaje de adultos (mayores de 15 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de niños (hasta los 14 años) que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica	Porcentaje de mujeres embarazadas con acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión maternoinfantil del VIH
África Oriental y Meridional	**61%** [49–69%]	**51%** [37–63%]	**89%** [71–>95%]
Asia y el Pacífico	**47%** [31–68%]	**40%** [25–64%]	**35%** [17–59%]
África Occidental y Central	**36%** [25–46%]	**22%** [13–29%]	**50%** [36–64%]
América Latina	**58%** [42–72%]	**54%** [39–67%]	**75%** [64–88%]
El Caribe	**52%** [41–60%]	**52%** [40–63%]	**74%** [65–84%]
Oriente Medio y África Septentrional	**24%** [15–41%]	**27%** [18–48%]	**20%** [15–41%]
Europa Oriental y Asia Central	**27%** [21–31%]	**—***	**—***
Europa Occidental y Central, y América del Norte	**78%** [64–87%]	**—***	**—***
Mundial	**54% [40–65%]**	**43% [30–54%]**	**76% [60–88%]**

* Las estimaciones no estaban disponibles en el momento de la publicación.

Contacto
Comunicaciones y Promoción Mundial | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

Más información disponible en aidsinfo.unaids.org