

PLAN INTEGRAL DE DROGODEPENDENCIAS
Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS DE EXTREMADURA

ESTUDES 2010 - EDADES 2011

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EXTREMADURA

Segunda parte

**INFORME ENCUESTA ESTUDES SOBRE
USO DE DROGAS EN ENSEÑANZA
SECUNDARIA EN EXTREMADURA 2010**

Febrero 2014

Un informe del Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social de la
Universidad de Extremadura



DIRECCIÓN

Artemio Baigorri Agoiz

COORDINACIÓN ESTUDES

Ramón Fernández Díaz

ANÁLISIS

Artemio Baigorri Agoiz

Manuela Caballero Guisado

Miguel Centella Moyano

Ramón Fernández Díaz

Santiago Cambero Rivero

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
	METODOLOGÍA.....	6
	CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO.....	8
2.	RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.....	9
3.	PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS	17
	TABACO	17
	ALCOHOL.....	26
	CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	35
	TRANQUILIZANTES.....	37
	CANNABIS.....	41
	COCAÍNA	46
	HEROÍNA	52
	SPEED / ANFETAMINAS	52
	ALUCINÓGENOS	54
	INHALABLES VOLÁTILES	55
	ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO.....	56
	GHB	57
	POLICONSUMO.....	58
	CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS.....	61
	CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA.....	62
4.	OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS.....	65
	RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	65
	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	71
5.	INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS..	74
6.	ENTORNO SOCIAL	77
7.	ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES	88

1. INTRODUCCIÓN

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. La encuesta del año 2010, como las anteriores, ha sido financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), y para su realización ha contado con la colaboración de los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación y del Ministerio de Educación.

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas diseñadas.

La encuesta ESTUDES plantea los siguientes objetivos específicos derivados del objetivo principal:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.*
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.*
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.*
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.*
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones*

METODOLOGÍA

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España.

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional.

Ámbito temporal: El periodo de recogida de información ha sido desde el 4 de noviembre al 19 de diciembre de 2010 y desde el 15 de febrero al 23 de marzo de 2011.

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. Selección aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas seleccionadas.

Tamaño de la muestra: Se seleccionan 857 centros educativos y 1.730 aulas. La muestra final es de 31.967 alumnos.

Recogida de información: Cuestionario anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) durante una clase (45-60 minutos). Incluye las mismas preguntas que en años anteriores (características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas) y se añaden dos módulos específicos (uno con preguntas sobre “nuevas sustancias” y otro con tres escalas sobre “consumo problemático de cannabis”).

La evolución en el número de estudiantes de secundaria y del tamaño de la muestra de la encuesta ESTUDES desde sus inicios en el año 1994 la tenemos en la tabla siguiente. Podemos observar que tanto en

España como en Extremadura se ha reducido el número de estudiantes de secundaria de manera importante -en Extremadura hay en el año 2010 un 20% menos de estudiantes de los que había en 1994- pese a ello el número de estudiantes incluidos en la muestra ha crecido a lo largo de los años y en el año 2010 es más del doble de la muestra del año 2004. También se ha incrementado el número de centros y de aulas en los que se realiza la encuesta.

Tabla 1.1. Evolución de parámetros de la muestra ESTUDES en España y Extremadura. 1994-2010

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Evolución de la distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias									
Total	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	103,5	102,4	94,6	89,9	88,8	81,7	72,0	79,1
Evolución de la distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra									
Total		18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967
Extremadura		659	718	443	796	1.693	777	807	1.370
Tasa variación Extremadura (%)		100,0	109,0	67,2	120,8	256,9	117,9	122,5	207,9
Evolución de la distribución de las aulas y centro educativos incluidos en la muestra ESTUDES									
Centros									
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	857
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	87,5	100,0	62,5	118,8	193,8	118,8	156,3	137,5
Aulas									
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45
Tasa variación Extremadura (%)	100,0	94,1	155,9	55,9	108,8	270,6	111,8	147,1	132,4

Fuente: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias. ESTUDES 2010.

En cuanto a la representatividad de la muestra hay que hacer una precisión: los datos dicen que en Extremadura se realizaron 1370 encuestas, y esos son los valores absolutos que se obtienen a la hora de analizar los datos, pero esto es resultado de la ponderación realizada. En realidad el fichero tiene 808 casos válidos, el margen de error de los datos globales para Extremadura es del $\pm 3,5\%$ en el caso de muestreo aleatorio simple, y siendo $p=q=50$.

CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos.

En 2010 se ha mantenido el módulo de preguntas básico, incluido en todos los años previos y se han introducido dos módulos específicos: uno sobre “nuevas sustancias” y otro sobre “consumo problemático de cannabis”.

- Módulo básico: incluye preguntas sobre características sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas.

- Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.

- Módulo sobre consumo problemático de cannabis: en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, se ha incorporado una serie de preguntas para evaluar determinadas escalas de estudio frente al consumo de cannabis.

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanentemente en el estrado.

2. RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: RESUMEN.

TABACO

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 meses observamos dos grandes tendencias: es mayor el porcentaje en las mujeres (38,9%) que en los hombres (25,0%) y el consumo, en general, aumenta con la edad. La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por hombres como por mujeres es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios, se fuma más en los centros públicos que en los privados y entre aquellos que cursan la F.P. de Grado Medio más que entre quienes estudian ESO o Bachillerato.

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,5 años; en los hombres se inicia a los 13,2 años y en las mujeres a los 13,7 años. En cuanto a la edad a la que se empieza a consumir tabaco a diario, las mujeres lo hacen a los 14,2 años, muy poco después que los hombres que empiezan a los 13,9 años. Estos datos ponen de manifiesto la conexión que existe entre fumar por primera vez y hacerlo diariamente tanto en hombres como en mujeres.

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros educativos, la situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan visto fumar a los profesores dentro del centro educativo (47,9%), esta situación es más frecuente en los colegios privados (63,0%) que en los públicos (44,0%). Por el contrario, el 50,3% del alumnado ha visto fumar a estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. Esta situación es más frecuente en los centros públicos (53,7%) que en los privados (36,6%).

Por último, sólo el 44,3% de los y las estudiantes que fuman han intentado dejarlo; son más las mujeres (46,2%) que los hombres (40,2%). El 40,0% de los y las estudiantes piensan actualmente dejar de fumar y les gustaría hacerlo en los próximos 6 meses, esa actitud es más frecuente entre las mujeres (42,5%) que entre los hombres (34,8%).

ALCOHOL

Utilizando el mismo rango temporal de los últimos 12 meses el consumo global de alcohol ha sido de 70,8%, han consumido en mayor medida los hombres (73,1%) que las mujeres (69,0%); el consumo

aumenta con la edad siendo especialmente significativo el aumento que se produce en el paso de los 14 a los 15 años.

Por sexos los datos indican que chicos y chicas comienzan a la misma edad a beber alcohol por primera vez, pero ellos empiezan antes que ellas a consumirlo semanalmente. Los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño alcanza un total del 42,3%, siendo el porcentaje superior en los hombres (45,6%) que en las mujeres (39,7%).

En cuanto a conductas de riesgo un total de 9,0% del alumnado extremeño ha viajado en cuatro y más ocasiones en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses, dato que en general aumenta con la edad. El sexo no influye decisivamente en el comportamiento analizado. Al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, el 91,7% no ha conducido en esas condiciones ningún día, siendo las mujeres quienes en mayor proporción lo hacen.

En relación a las diferentes situaciones que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, las peleas o agresiones físicas son las más habituales siendo en los chicos (16,9%) el porcentaje es superior que en las chicas (8,1%). En general los chicos han experimentado en mayor porcentaje que las chicas situaciones como accidente con asistencia médica, pelea o agresión física, asistencia sanitaria urgente y ser detenido por policía o guardia civil.

El consumo de alcohol es dispar entre los días laborables (54,1%) y los fines de semana (19,4%). Las bebidas más consumidas en fines de semana (viernes, sábado y domingo), tanto por hombres como por mujeres son combinados y cubatas. En los días laborables (hay que hacer notar que los jueves son días habituales de botellón) las bebidas más consumidas por hombres y mujeres son cerveza y combinados. Las bebidas menos consumidas por los jóvenes tanto en los fines de semana como en los días laborables son los aperitivos tales como el vermut.

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína

(considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

En los últimos 12 meses el 27,8% de los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años admiten haberlas consumido. El consumo en este periodo de tiempo es muy similar entre hombres y mujeres; en general aumenta con la edad. Por nivel de enseñanza el consumo es mayor entre los y las estudiantes de F.P. de Grado Medio.

Ahora bien, si exceptuamos los cannabáceos y los tranquilizantes sin receta, el consumo del resto de sustancias, tal como se aprecia en la tabla 2.1, tiene una prevalencia baja, siendo la más alta la de la cocaína alguna vez. Realmente, el consumo declarado de estas drogas se manifiesta en casos concretos.

Tabla 2.1 Prevalencias del consumo de diferentes sustancias

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Tabaco	40,5	32,8	28,6
Alcohol	73,8	70,8	62,6
Cannabis	28,2	22,5	14,0
Tranquilizantes (sin receta)	10,0	4,3	2,0
Cocaína	1,2	0,6	0,4
Heroína	0,4	0,2	0,1
Speed y anfetaminas	0,6	0,1	0,1
Alucinógenos	0,5	0,4	0,0
Sustancias volátiles	0,9	0,6	0,3
Éxtasis	0,1	0,1	0,1
Ghb	0,4	0,2	0,1

TRANQUILIZANTES

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último año alcanza al 4,3% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años. El consumo es mayor en las mujeres que en los hombres y en general aumenta con la edad hasta alcanzar el 8,5% a los 18 años.

En cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros privados en la categoría de alguna vez en la vida con un 17,3%. Si nos referimos al nivel de enseñanza el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la F.P de Grado Medio (26,7%) para la categoría de haber consumido alguna vez en la vida.

CANNABIS

El consumo de cannabis en el último año ha sido del 22,5%; han consumido más los hombres que las mujeres y el consumo ha aumentado con la edad; es significativo el aumento en el paso de los 15 (13,3%) a los 16 años (30,9%) donde se duplica su consumo.

Si atendemos al periodo temporal de los últimos 30 días y analizamos el consumo de cannabis de los jóvenes en función de si han consumido o no tabaco en el mismo periodo de tiempo, el resultado nos indica que la inmensa mayoría de los estudiantes (96,1%) no consumen ni tabaco ni cannabis, el 39,0% de ellos consumen ambas sustancias. Los no consumidores de tabaco pero sí de cannabis sólo son el 3,9%, sin embargo ascienden al 61,0% los que si consumen tabaco pero no cannabis.

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 15,0 años, sin que existan para esta sustancia diferencias significativas por razón de sexo.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

En los últimos 12 meses un 20,4% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión. Los porcentajes de consumo en hombres y mujeres son muy similares. El aumento del consumo está muy ligado a la edad que aumenta conforme lo hace ésta pasando de un 3,5% a la edad de 14 años a un 32,8% a la edad de 18 años.

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos (20,8%) que en los colegios privados (17,3%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 40,0% del alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAINA

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años fue del 2,3%. La prevalencia del consumo es mayor entre los hombres (3,4%) que entre las mujeres (1,4%). Con respecto a la edad los datos indican que el consumo conjunto de ambas sustancias aumenta con la edad, siendo nulo a la edad de 14 años y alcanzando el máximo (6,1%) a la edad de 18 años.

En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto de ambas sustancias es mayor en los colegios públicos (2,4%) que en los privados (2,2%), y con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el alumnado de F.P de Grado Medio, alcanzando un 6,7%.

POLICONSUMO

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo de estas tres sustancias es bastante habitual.

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es significativo por los pocos casos contabilizados.

RIESGO PERCIBIDO

Para algo más de la mitad de los alumnos extremeños consultados el consumo de drogas, en general, de manera esporádica es o puede ser bastante o muy problemático, mientras que para dos de cada diez un consumo tal tendría repercusiones mínimas. Preguntados por drogas concretas, alrededor de seis de cada diez de estos jóvenes entiende que el consumo no habitual de las ilegales, salvo el cannabis, aproximadamente la mitad, puede resultar bastante o muy problemático. Entre las chicas y los más mayores esta percepción es algo mayor.

Si hablamos de consumo habitual, siete de cada diez encuestados entienden esto como bastante o muy problemático, la mitad como muy problemático y uno de cada diez como poco problemático. Esa percepción lo es tanto para las drogas en general como para las ilegales. En el caso del tabaco y alcohol, cuando dicho consumo es abusivo se señala como fuente de problemas graves al menos por tres de cada cuatro jóvenes. Cuando su consumo es moderado, en cambio, esa percepción podemos observarla entre cuatro de cada diez aproximadamente. Nuevamente las chicas ven más perniciosos un uso cotidiano de las drogas que los chicos y los más mayores más que los más jóvenes.

DISPONIBILIDAD

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de

cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende a menos de la de los encuestados, desde el 47,6% de alumnos en el caso del cannabis, al 13% para la heroína, la droga, según ellos, más difícil de obtener.

INFORMACIÓN RECIBIDA

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo. Casi cuatro de cada diez dicen sentirse perfectamente informado y otros tantos suficientemente informados. Tan solo uno de cada 25 declara sentirse mal informado.

ENTORNO SOCIAL

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas por sus amigos y compañeros. En los dos casos se consume en mayor medida en el entorno de las chicas que el de los chicos, con diferencias importantes especialmente en el caso del tabaco. En el entorno de las chicas también se producen más casos de jóvenes que se emborracharon en el último mes y menos que se consumiera hachís y derivados.

El consumo está de sustancias legales o ilegales está tan extendido en el entorno de los jóvenes que solamente uno de cada once son los que dicen que ninguno de sus amigos y/o compañeros ha consumido alguna de ellas.

Casi uno de cada cinco escolares se ha visto involucrado en algún incidente importante como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, aproximadamente la mitad de los que han consumido, siendo la más frecuente de ellas las peleas.

La inmensa mayoría de los escolares tienen buenas relaciones tanto con su padre como con su madre, y la proporción baja a medida que van cumpliendo años. Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 27%.

Incidentes más graves, como ser víctimas de robos o ser expulsados del centro educativo, o fugarse de casa es bastante menos frecuente, lo han padecido entre el 2 y el 5% de los entrevistados.

La mayoría entiende que los padres fijan normas claras de lo que se puede o no hacer tanto en casa como fuera de casa. Especialmente en el hogar, donde sólo un 15% entiende que no siempre sucede así, proporción que se duplica en relación con las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, un 36% dice que esas normas claras existen raras veces o casi nunca.

La mayor parte, tres de cada cuatro entrevistados, dice que sus padres saben con quién están cuando salen de noche, pero son menos, el 58%, los que dicen que también saben dónde están.

Son pocos, aproximadamente el 6%, los que dicen no tener fácil recibir el cariño tanto de sus padres como de sus compañeros, la proporción aumenta de manera importante a medida que van cumpliendo años.

CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Parece más probable que los alumnos fumadores tengan peores relaciones con sus padres, existiendo una relación estadísticamente significativa, pero el consumo de tabaco no condiciona las relaciones con las madres.

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace más probable el consumo de los escolares. Existe también una relación importante entre el consumo de tabaco y la permisividad de los jóvenes, de forma que hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar, mientras que esa proporción es muy baja cuando los progenitores no son nada permisivos.

El tipo de relaciones que se mantiene con los padres no parece condicionar el consumo de alcohol de los jóvenes, pero sí que parece que con lo condiciona el hecho de emborracharse, podíamos decir que el consumo conflictivo. En definitiva, consumen en proporciones similares los que tienen buenas o malas relaciones con sus padres, pero se emborrachan en mayor medida los que tienen malas relaciones con su padre o con su madre.

La tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la proporción de hijos consumidores entre los padres que no les permiten a sus hijos el consumo de alcohol la proporción de consumidores está en torno al 55% y cuando los padres son permisivos pasa del 80%.

3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

TABACO

La tabla siguiente pone de manifiesto que el 40,5% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años han fumado tabaco al menos alguna vez en su vida; el porcentaje disminuye claramente cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en este caso estamos hablando del 28,6%.

Tabla 3.1.1. Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 30 días
Total	40,5	28,6
Sexo		
Hombre	36,0	20,6
Mujer	44,1	35,0
Edad		
14 años	12,6	6,6
15 años	62,0	22,4
16 años	46,8	31,8
17 años	61,3	46,7
18 años	40,3	37,8

Otros datos de la tabla que entendemos relevantes son:

- ✓ La relación no lineal entre la edad y haber consumido tabaco alguna vez (el porcentaje a la edad de 16 años, 46,8% es claramente inferior al precedente (62,0%)
- ✓ En cuanto a los últimos 30 días Algo similar ocurre entre la edad y haber consumido tabaco en los últimos 30 días, el porcentaje a los 18 años, 37,8% es muy inferior a su precedente (46,7%)
- ✓ Los altos porcentajes de mujeres, que en relación a los hombres, han consumido o consumen tabaco tanto en un caso (alguna vez en su vida), como en otro (durante el último mes), nos indican que las mujeres fuman más, son mayores consumidoras de tabaco que los hombres.

Tabla 3.1.2. Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 12 meses

Total	32,8
Sexo	
Hombre	25,0
Mujer	39,0
Edad	
14 años	10,0
15 años	25,5
16 años	38,3
17 años	50,3
18 años	37,8

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los últimos 12 meses podemos observar los mayores porcentajes en mujeres (39,0%) y cómo el consumo aumenta según la edad; en cambio, en el paso de los 17 a los 18 años el porcentaje se reduce notablemente.

Tabla 3.1.3. Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	5,1	13,7	23,3	22,1	7,4	8,1	21,0	23,9	40,4	35,3
Consumo últimos 12 meses	4,0	9,2	17,0	12,9	2,5	6,0	16,3	21,4	37,4	35,3
Consumo últimos 30 días	1,7	7,5	13,7	12,5	2,5	4,9	14,8	18,2	34,2	35,3

La tabla 3.1.3 nos muestra las prevalencias del consumo de tabaco por sexo y edad simultáneamente; en ella podemos comprobar como el consumo generalmente aumenta con la edad, aunque hay excepciones, sobre todo en los hombres en el paso de los 16 a los 17 años y de éstos a los 18 para todos los periodos temporales. En el caso de las mujeres se puede observar cómo el consumo aumenta con la edad para todos los periodos temporales, a excepción del paso de los 17 a los 18 para los periodos de haber consumido alguna vez, y del consumo en los últimos 12 meses

Tabla 3.1.4. Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente

Años de edad	Hombre				Mujer			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	167,1	69,9	-5,0	-66,6	158,9	13,6	69,3	-12,6
Consumo últimos 12 mes	126,7	85,4	-24,2	-80,9	63,5	23,4	43,0	-6,0
Consumo últimos 30 días	341,1	81,1	-8,5	-80,3	203,9	22,5	88,3	3,4

De la información que nos ofrece la tabla 3.1.4 podemos destacar que el incremento porcentual más alto (341,1) corresponde a los hombres al pasar de 14 a 15 años para el consumo ocurrido en los últimos 30 días; también coincide para esa edad y periodo en el caso de las mujeres (203,9). Por el contrario, el incremento porcentual más bajo (-80,3) que se produce en los hombres, se sitúa en el paso de los 17 a los 18 años para el consumo en los últimos 12 meses. En las mujeres el incremento porcentual más bajo también se produce en el paso de los 16 a los 17 años y para el periodo de consumo de los últimos 30 días.

Tabla 3.1.5. Prevalencia de consumo de tabaco según tipo de enseñanza

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
ESO	35,8	29,3	26,0
Bachillerato	48,1	38,1	31,9
F.P. Grado Medio	40,0	33,3	33,3

El alumnado de bachillerato es quien mayor prevalencia tiene en el consumo de tabaco para las dos primeras categorías (alguna vez y últimos 12 meses), siendo el alumnado de la ESO quien menor prevalencia tiene para todas las categorías

Tabla 3.1.6. Frecuencia de consumo de tabaco y cantidad diaria consumida entre los consumidores de tabaco en los últimos 30 días

	Tabaco diario consumido			Tabaco diario consumido últimos 30 días		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
De 1 a 5 cigarrillos	56,8	60,7	59,4	21,3	40,6	35,0
De 5 a 10 cigarrillos	34,5	32,8	33,4	63,8	50,8	54,5
Más de 10 cigarrillos	8,8	6,5	7,2	15,0	8,6	10,4

La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por hombres como por mujeres es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios. La prevalencia en el consumo no va necesariamente asociada a la cantidad consumida puesto que la prevalencia, aunque es mayor en las mujeres (60,7%), la cantidad de cigarrillos diarios es superior en los hombres: un 8,8% de ellos reconocen consumir más de 10 cigarrillos al día, frente a un 6,5% de mujeres que señalan esa misma cantidad.

En cuanto al consumo diario en los últimos 30 días, son las mujeres quien en mayor porcentaje (40,6%) fuman de 1 a 5 cigarrillos diarios; el consumo de 5 a 10 cigarrillos y más de 10 son nuevamente los hombres los que alcanzan porcentajes mayores 63,8% y 14,5% respectivamente.

Tabla 3.1.7. Prevalencia en el consumo diario de tabaco según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza

Total	41,8
Sexo	
Hombre	35,0
Mujer	45,3
Edad	
14 años	21,2
15 años	24,5
16 años	40,5
17 años	54,0
18 años	58,0
Titularidad	
Público	44,5
Privado	28,6
Tipos de enseñanza	
ESO	41,3
Bachillerato	35,0
FP Grado Medio	80,0

Un 41,8% de los y las estudiantes consume diariamente tabaco y en mayor porcentaje las mujeres (45,3%) que los hombres (35,0%). En relación a la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 años (21,2%) a los 18 años (58,0%). En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, son mayores consumidores diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos (44,5%) y aquellos que cursan la F.P. de Grado Medio (80,0%).

Tabla 3.1.8. Frecuencia en el consumo de tabaco en el último mes según sexo y edad

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana, pero no diariamente	Diariamente
Total	12,6	13,8	31,8	41,8
Sexo				
Hombre	17,1	14,1	33,7	35,0
Mujer	10,3	13,6	30,8	45,3
Edad				
14 años	29,8	4,8	44,2	21,2
15 años	14,7	11,6	49,2	24,5
16 años	16,9	19,0	23,6	40,5
17 años	6,5	14,2	25,3	54,0
18 años	0,0	0,0	42,0	58,0

En la tabla 3.1.8 aparecen desagregados por sexo y edad las frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes, en ella podemos comprobar que sólo el 12,6% no ha fumado nunca y que lo hacen con mayor frecuencia los hombres que las mujeres. Con respecto a la edad se observa que el consumo aumenta a medida que lo hace la edad y que son los de 18 años los que en mayor medida consumen diariamente (58,0%).

Tabla 3.1.9. Número medio de cigarrillos consumidos al día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza

Total	5,0
Sexo	
Hombre	5,3
Mujer	4,8
Edad	
14 años	4,8
15 años	3,6
16 años	5,6
17 años	4,7
18 años	6,1
Titularidad	
Público	5,0
Privado	4,6
Tipos de enseñanza	
ESO	5,5
Bachillerato	4,0
FP Grado Medio	6,2

El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de (5), fuman más los hombres (5,3) que las mujeres (4,8), el consumo aumenta a medida que lo hace la edad, se fuma más en los centros públicos que en los privados y en F.P de Grado Medio (6,2) más que en Bachillerato o ESO (4,0).

Tabla 3.1.9.1 Edad Media de consumo de tabaco según sexo y edad

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo diario
Total	13,5	14,1
Sexo		
Hombre	13,2	13,9
Mujer	13,7	14,2
Edad		
14 años	11,8	12,8
15 años	13,2	13,7
16 años	13,6	14,1
17 años	13,9	14,7
18 años	13,5	13,3

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,5 años y aumenta a medida que lo hace la edad bajando ligeramente a los 18 años. Las edades de consumo de tabaco por primera vez en hombres (13,9) y mujeres (14,2) son muy similares. En el caso de la edad (14,10) en la que se empieza a consumir a diario, las mujeres (14,23) lo hacen un poco después que los hombres (13,9).

Tabla 3.1.10 Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del centro educativo según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	47,7	21,7	7,6	7,4	12,4
Titularidad					
Público	43,9	24,2	8,8	7,1	12,5
Privado	63,0	11,5	2,7	8,5	12,1
Edad					
14 años	47,6	19,8	4,4	5,3	19,7
15 años	51,7	18,3	5,7	8,8	13,3
16 años	48,5	19,8	6,1	7,1	13,8
17 años	38,1	26,0	18,9	8,7	4,4
18 años	53,7	34,0	0,0	4,9	7,4

La situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan visto fumar a los profesores dentro del centro educativo (47,7%), esta situación es más frecuente en los colegios privados (63,0%) que en los públicos (43,9%) y es el alumnado de 18 años (53,7%) quienes en mayor medida no han visto ningún día fumar a los profesores dentro del centro educativo.

Tabla 3.1.11 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro escolar según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	19,7	50,3	10,4	7,5	11,1
Titularidad					
Público	16,9	53,7	10,3	7,8	10,3
Privado	31,5	36,6	10,4	6,4	14,4
Edad					
14 años	20,4	38,8	16,0	9,2	15,0
15 años	24,7	42,4	12,0	9,4	11,0
16 años	13,6	56,5	8,5	6,6	13,7
17 años	18,8	57,6	11,1	5,4	5,4
18 años	30,5	55,9	0,0	7,4	6,2

En la tabla 3.1.11 podemos apreciar como el 50,3% del alumnado ha visto fumar a estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. Esta situación es más frecuente en los centros públicos (53,7%) que en los privados (36,6%) y son los mayores de 17 años los que en mayor medida (57,6%) han presenciado esta situación.

Tabla 3.1.12 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad y edad

	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproximadamente la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	41,5	25,2	8,0	5,8	9,4
Titularidad					
Público	37,1	28,1	9,0	5,7	8,8
Privado	59,3	13,2	4,2	6,1	11,4
Edad					
14 años	47,4	14,2	12,7	5,1	12,7
15 años	49,6	20,3	7,6	4,7	12,3
16 años	38,0	27,9	7,0	7,6	5,8
17 años	31,7	34,2	8,7	3,3	12,0
18 años	41,6	30,4	2,5	8,5	2,5

La gran mayoría del alumnado (41,5%) no ha visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, esta situación es más habitual en los centros privados (59,3%) que en los públicos (37,1%) y es el alumnado de 14 años el que en mayor medida observan esta situación.

Tabla 3.1.13 ¿Se ha planteado dejar de fumar? Por sexo y edad

	No me lo he planteado	Sí, y lo he intentado	Sí, pero no lo he intentado
Total	19,8	44,3	33,44
Sexo			
Hombre	27,5	40,2	29,4
Mujer	15,4	46,2	35,3
Edad			
14 años	16,4	35,4	25,9
15 años	19,8	42,8	37,4
16 años	17,4	49,3	29,2
17 años	19,2	47,8	31,0
18 años	26,0	22,5	51,5

La tabla anterior refleja que el 44,3% de los y las estudiantes que fuman han intentado dejarlo, son más las mujeres (46,2%) que los hombres (40,2%) las que hacen el intento. Son los estudiantes de 18 años (51,5%) los que se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado.

Tabla 3.1.14 ¿Piensa actualmente dejar de fumar? Por sexo y edad

	No pienso dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses	Sí, he decidido que dejaré de fumar en los próximos 30 días	Sí, me gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses
Total	27,5	23,5	40,0
Sexo			
Hombre	36,8	22,4	34,8
Mujer	23,1	24,1	42,5
Edad			
14 años	25,9	8,2	43,6
15 años	23,0	32,9	40,5
16 años	17,8	28,5	41,0
17 años	32,0	19,5	39,6
18 años	58,0	6,5	35,5

El 40,0% de los y las estudiantes piensan actualmente dejar de fumar y les gustaría hacerlo en los próximos 6 meses, esa actitud es más frecuente entre las mujeres (42,5%) que entre los hombres (34,8%). Sin embargo es la edad de 18 años la que consigue mayor porcentaje (58,0%) en la categoría no pienso dejar de fumar al menos en los próximos 6 meses.

Tabla 3.1. 15 ¿Le molesta que otras personas fumen en lugar cerrado? Según sexo y edad

	Nada	Mucho	Bastante	Poco
Total	20,2	25,5	24,8	29,5
Sexo				
Hombre	18,4	25,6	25,9	30,1
Mujer	21,7	25,4	23,9	29,0
Edad				
14 años	14,2	30,5	34,0	21,4
15 años	17,8	24,1	25,3	32,5
16 años	19,9	26,3	18,9	34,9
17 años	29,2	20,4	26,1	24,4
18 años	20,8	28,1	25,5	25,6

Respecto a las opiniones sobre si les molesta a los y las estudiantes que otras personas fumen en su presencia en lugares cerrados, al 49,7% le molesta poco o nada y al 50,3% mucho o bastante. Son los estudiantes de 14 años a quienes molesta mucho y bastante (64,5%) que se fume en su presencia en lugares cerrados.

Tabla 3.1. 16 Personas con las que convives que fumen diariamente según sexo y edad

	No	Sí	Vives en un centro educativo o institución
Total	47,6	52,4	0,1
Sexo			
Hombre	46,4	53,6	0,0
Mujer	48,5	51,3	0,2
Edad			
14 años	56,1	43,9	0,0
15 años	47,5	52,5	0,0
16 años	45,2	54,5	0,3
17 años	46,5	53,5	0,0
18 años	42,7	57,3	0,0

Un 52,4% del alumnado vive con personas que fuman diariamente, son más los hombres (53,6%) que las mujeres (51,3%) quienes lo hacen. En cuanto a la edad son los estudiantes de 18 años (57,3%) quienes en mayor medida conviven con personas que fuman diariamente.

ALCOHOL

Tabla 3.2.1 Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad

Total	73,8
Sexo	
Hombre	76,5
Mujer	71,7
Edad	
14 años	36,4
15 años	69,1
16 años	82,1
17 años	91,9
18 años	83,9

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes extremeñas; en global un 73,8% ha consumido alcohol alguna vez en su vida siendo mayor este porcentaje entre los hombres (76,5%) que entre las mujeres (71,7%). Si atendemos a la edad, la prevalencia en el consumo de alcohol, en general, aumenta con los años siendo significativo el paso de los 14 a los 15 años y la disminución que se produce de los 17 a los 18 años.

Tabla 3.2.2 Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad

Total	70,8
Sexo	
Hombre	73,1
Mujer	69,0
Edad	
14 años	33,3
15 años	72,1
16 años	80,7
17 años	84,7
18 años	79,8

En los últimos 12 meses el consumo global de alcohol ha sido del 70,8%, han consumido en mayor medida los hombres (73,1%) que las mujeres (69,0%); el consumo aumenta con la edad, con dos pasos significativos, el aumento que se produce de los 14 a los 15 años y la disminución de los 17 a los 18 años.

Tabla 3.2.3 Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes según sexo y edad

Total	62,6
Sexo	
Hombre	64,0
Mujer	61,6
Edad	
14 años	28,1
15 años	58,6
16 años	73,4
17 años	75,7
18 años	67,6

De la misma forma que en la tabla precedente, el consumo de alcohol en el último mes es mayor en los hombres (64,0%) que en las mujeres (61,6%) y también aumenta con la edad; llama la atención el aumento que se produce en el paso de los 14 a los 15 años y la reducción de los 17 a los 18 años.

Si como veíamos en la tabla anterior (3.2.3) la prevalencia en el consumo de alcohol en el último mes es de 62,6%, al cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante diferente. De los que no consumen tabaco, un 49% tampoco consume alcohol, y un 51% sí lo hace. Por el contrario, de los que sí consumen tabaco un 11% no consume alcohol y el 89% sí lo hace, por lo que podíamos concluir que el consumo de tabaco favorece el consumo de alcohol

Tabla 3.2.4 Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo de tabaco en los últimos 30 días

		Alcohol	
		No consume	Consume
Tabaco	No consume	49,0	51,0
	Consume	11,0	89,0

La tabla 3.2.5 representa la edad media de comienzo de consumo de alcohol. Si observamos comprobamos que la edad media en la que chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 13,7 años, un poco después se produce la edad media de comienzo de consumo de alcohol semanal situada en los 14,6 años.

Por sexos los datos indican que chicos y chicas comienzan prácticamente a la misma edad a beber alcohol por primera vez y también a consumirlo semanalmente. En cuanto a la edad observamos que a medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol tanto de consumo por primera vez como semanalmente.

Tabla 3.2.5 Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y edad

	Edad media de consumo por primera vez	Edad media comienzo consumo semanal
Total	13,7	14,6
Sexo		
Hombre	13,7	14,6
Mujer	13,8	14,7
Edad		
14 años	12,8	13,4
15 años	13,5	14,1
16 años	13,7	14,7
17 años	14,1	14,6
18 años	14,6	15,7

La tabla 3.2.6, que mide la intensidad en el consumo de alcohol, nos ofrece los siguientes datos: el 56,2% de los y las estudiantes se han emborrachado alguna ven en la vida, un 50,6% lo ha hecho en los últimos 12 meses y un 33,1% en los últimos 30 días.

Tabla 3.2.6 Prevalencias de borracheras según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	56,2	50,6	33,1
Sexo			
Hombre	59,3	53,9	35,4
Mujer	53,8	48,3	31,5
Edad			
14 años	12,5	11,1	8,4
15 años	42,1	38,6	25,3
16 años	66,6	62,2	32,9
17 años	84,3	74,4	51,1
18 años	80,8	69,5	69,5

Los resultados de la tabla anterior (3.2.6) aparecen distribuidos conjuntamente por sexo y edad y en la siguiente (3.2.7) se pone de manifiesto cómo, en general, la prevalencia de borracheras aumenta conforme lo hace la edad, aunque hay excepciones: los hombres en el paso de los 16 a los 17 años en el consumo en el último año y en el consumo en los últimos 30 días, y las mujeres en el paso de los 17 a los 18 años consumiendo alguna vez en la vida y en el consumo en el último año; y en el paso de los 15 a los 16 años en el consumo en los últimos 30 días.

El mayor incremento en el porcentaje de jóvenes que reconocen haberse emborrachado se produce en el caso de los chicos de los 17 a 18 años dentro del consumo en los últimos 30 días; en el caso de las chicas el mayor incremento en el porcentaje se sitúa en el paso de los 14 a los 15 años para el caso de haberse emborrachado alguna vez en la vida. Otros datos interesantes, en el caso de las chicas, es la reducción del porcentaje de borracheras en el paso de los 17 a los 18 años tanto en la categoría de alguna vez en la vida como en el último año.

Tabla 3.2.7 Prevalencias de borracheras según sexo y edad simultáneamente

Edad en años	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Se ha emborrachado alguna vez	18,1	39,3	71,7	87,1	100	9,1	44,2	61,8	83,7	69,2
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	14,3	35,0	69,1	80,7	77,4	9,1	41,2	55,2	72,8	63,5
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	11,4	20,7	43,1	46,6	77,4	7,3	28,6	22,8	53,2	63,5

En el gráfico inferior puede apreciarse que los atracones de alcohol o “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas), en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño, alcanza un total del 42,3%. Los atracones de alcohol en este periodo son superiores en los hombres que en las mujeres, aumenta con la edad especialmente en el paso de los 16 a los 17 años y vuelve a reducirse en el paso de los 17 a los 18 años.



Tabla 3.2.8 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad

	No han bebido nada	Ningún día (0 días)	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	38,5	19,1	10,5	6,1	8,7	8,6	4,7	1,9	1,9
Sexo									
Hombre	37,4	17,0	11,5	7,2	7,1	10,5	4,6	1,7	3,0
Mujer	39,4	20,7	9,7	5,3	9,9	7,2	4,8	2,0	1,0
Edad									
14 años	74,8	11,4	6,4	0,7	1,9	1,4	1,7		1,7
15 años	43,2	22,8	8,0	6,0	6,6	9,0	1,8	0,8	1,8
16 años	36,3	18,8	11,8	7,9	9,2	8,9	5,1	1,8	0,2
17 años	24,7	13,2	12,9	7,1	13,4	12,9	6,2	5,1	4,5
18 años	32,4	28,3	8,2	2,7	9,4	5,4	10,9		2,7

La tabla 3.2.8 presenta los datos obtenidos del cruce entre la cantidad de alcohol consumida en los últimos 30 y el sexo y la edad. En general la toma de 5 o más vasos de alcohol aumenta con la edad a excepción del paso de los 17 a los 18 años; en cuanto al sexo no podemos afirmar que esta variable sea explicativa de este comportamiento.

La tabla siguiente (3.2.9) refleja que un total de 9,0% del alumnado extremeño ha viajado en cuatro y más ocasiones en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses, dato que en general aumenta con la edad, El sexo no influye decisivamente en el comportamiento analizado.

Tabla 3.2.9 Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses según sexo y edad

	Ningún día (0 días)	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	72,1	7,6	5,7	5,5	2,7	1,4	0,9	4,0
Sexo								
Hombre	74,4	7,0	5,4	3,2	3,2	1,9	1,6	3,3
Mujer	70,3	8,0	6,0	7,4	2,4	1,0	0,3	4,5
Edad								
14 años	89,4	1,7	1,6	1,1	2,5	1,3	1,1	1,3
15 años	81,6	8,5	5,8	3,3	1,7	0,3	0,3	5,5
16 años	69,2	8,0	8,3	5,5	3,0	2,1	1,3	2,7
17 años	55,5	11,0	6,6	10,3	5,2	2,6	1,1	7,7
18 años	75,2	8,7	2,5	11,1	1,3			2,5

Al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol (tabla 3.2.10), el 91,7% no ha conducido en esas condiciones ningún día, siendo las mujeres quienes en mayor proporción lo hacen. En cuanto a la edad cabe destacar como este tipo de conducta disminuye con la edad en la categoría de ningún día.

Tabla 3.2.10 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	10-19 días	20 días o más
Total	91,7	3,0	1,0	1,2	1,2	0,3	1,6
Sexo							
Hombre	85,1	4,6	1,8	2,3	2,3	0,8	3,1
Mujer	97,1	1,7	0,6	0,0	0,2	0,0	0,4
Edad							
14 años	95,2	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
15 años	92,3	3,1	0,5	2,6	1,0	0,0	0,5
16 años	91,2	3,7	0,3	1,5	1,5	0,0	1,8
17 años	93,8	1,9	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
18 años	83,1	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2

Tabla 3.2.11 Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y titularidad del centro y porcentaje de jóvenes que consumieron alcohol las dos horas anteriores

	Accidente	Consumo de alcohol dos horas previas	Pelea o agresión física	Consumo de alcohol dos horas previas	Asistencia sanitaria urgente	Consumo de alcohol dos horas previas	Detenido por policía o guardia civil	Consumo de alcohol dos horas previas
Total	2,2	8,0	12,8	25,9	6,6	11,0	1,5	5,0
Sexo								
Hombre	2,9	5,9	16,9	33,3	6,1	18,9	2,4	7,1
Mujer	1,7	12,5	8,1	13,6	7,0	5,6	0,8	
Edad								
14 años	0,9		9,8	14,3	6,9		0,9	
15 años	1,8	20,0	9,3	17,2	6,9	4,5	2,4	
16 años	4,3	6,3	15,3	37,3	7,0	16,1	2,4	10,0
17 años	1,2		11,8	17,2	4,5	27,3		
18 años			11,2	25,0	10,2			
Titularidad								
Público	2,3	13,6	10,1	27,2	6,0	12,5	1,4	
Privado	1,9	0,0	19,3	17,6	9,3	4,0	1,9	20,0

La tabla 3.2.11 refleja diferentes situaciones que pudieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses y la relación entre estas situaciones y el hecho de haber consumido alcohol las dos horas previas. Las peleas o agresiones físicas (12,8%) son las más habituales, y en los chicos (16,9%) el porcentaje es superior que en las chicas (8,1). En general los chicos han experimentado en mayor porcentaje que las chicas todas las situaciones propuestas (accidente con asistencia médica, pelea o agresión física, asistencia sanitaria urgente, detenido por policía o guardia civil), a excepción de la asistencia sanitaria urgente. Para ambos sexos en general las frecuencias aumentan conforme lo hace la edad.

Atendiendo a la titularidad, los porcentajes son mayores para el caso de peleas y agresiones físicas en los colegios privados (19,3%), aunque el consumo de alcohol es mayor en el caso de los públicos (27,2%). También es mayor en los colegios privados los porcentajes de asistencia sanitaria urgente (9,3%), y como en el caso anterior, la prevalencia del alcohol en las dos horas antes es mayor en los centros públicos (12,5%).

La siguiente tabla pone de manifiesto que el consumo de alcohol es bastante dispar entre los días laborables (19,4%) y los fines de semana (54,1%), Las bebidas más consumidas en fines de semana (viernes, sábado y domingo), tanto por hombres como por mujeres son combinados y cubatas, siendo estas últimas las mayores consumidoras (59,0%). En los días laborables las bebidas más consumidas tanto por los hombres como por mujeres son la cerveza y los combinados. Las bebidas menos consumida por los jóvenes, tanto en los fines de semana como en los días laborables, son los aperitivos tipo vermut.

Tabla 3.2.12 Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida

	Algún día laborable ¹			Algún día en fin de semana		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Total	22,6 (54,5)	16,9 (55,2)	19,4 (54,9)	53,4	54,7	54,1
Tipo de bebida						
Vino/Champán	6,5	3,8	5,0	20,4	17,9	19,0
Cerveza	18,4	8,9	13,0	38,8	21,2	28,8
Aperitivos/Vermut	5,8	2,3	3,8	12,8	10,2	11,3
Combinados/Cubatas	14,6	11,0	12,6	59,0	55,6	57,0
Licores de frutas	8,2	6,5	7,2	15,8	17,9	17,0
Licores fuertes (1)	(53,5)	(55,2)	(54,5)	26,1	19,9	22,5

La distribución del consumo de alcohol durante los días de la semana (tabla 3.2.13) resume los diferentes hábitos de consumo entre días laborales y fines de semana.

Tabla 3.2.13 Prevalencias del consumo de alcohol algún día laborable o algún fin de semana

Consumidores de los últimos 30 días	
Fin de semana	54,1
Días laborables	19,4

¹ Los valores del consumo de 'Licores fuertes' en días laborables que aparecen entre paréntesis están claramente fuera de rango, por lo que no han sido considerados en los cálculos. Es evidente la existencia de algún error en los microdatos, que no es posible detectar sin acceder a los cuestionarios, pues probablemente tenga su origen o bien en dichos cuestionarios, o bien en su digitalización. Por ello en la fila correspondiente al total, para el total se incluyen entre paréntesis los datos, claramente irreales, que resultarían si los tuviésemos en cuenta.

La continuidad en el consumo de alcohol reflejada en la tabla 3.2.14 pone de manifiesto que es superior para las mujeres y aumenta con la edad a excepción del paso de los 17 a los 18 años. Es prácticamente el mismo en colegios públicos que en privados y se consume en mayor medida entre quienes cursan en el bachiller.

En términos generales, el 96% de los y las estudiantes extremeños entre 14 y 18 años que han consumido alcohol alguna vez en su vida han seguido haciéndolo en los últimos 12 meses. El 89,2% del alumnado que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses sigue haciéndolo en los últimos 30 días. Asimismo, el 85,5% de los y las que consumieron alcohol alguna vez en su vida lo ha hecho en los últimos 30 días.

Tabla 3.2.14 Continuidad en el consumo de alcohol

	Vida/12 meses	12 meses/30 días	Vida/30 días
Total	96,0	89,2	85,5
Sexo			
Hombre	95,9	88,4	84,2
Mujer	96,1	89,9	86,5
Edad			
14 años	93,0	86,4	78,1
15 años	98,1	86,9	85,2
16 años	98,2	91,9	90,2
17 años	92,4	90,3	82,7
18 años	95,2	84,8	80,7
Titularidad			
Pública	95,6	89,4	85,1
Privada	97,8	89,2	87,2
Nivel de enseñanza			
ESO	97,2	88,5	85,4
Bachiller	95,6	91,9	87,9
F.P. Grado Medio	90,5	80,3	72,6

En relación al consumo de alcohol en el hogar, es más frecuente el consumo entre los padres que entre las madres; también es más frecuente entre éstos beber algún día aislado, hacerlo los fines de semana o casi todos los días moderadamente, Es prácticamente insignificante el porcentaje de padres y madres que hayan abusado del alcohol todos o casi todos los días.

Tabla 3.2.15 Consumo de alcohol en el hogar

	Padre	Madre
No ha bebido ningún día	24,6	55,2
Ha bebido algún día aislado	32,9	24,4
Ha bebido solo los fines de semana	22,2	9,6
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	10,3	3,7
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,6	0,2
No lo sabe	8,2	4,9

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 35,2% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, el consumo es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad hasta llegar al 52,5% a los 18 años. El consumo también es mayor en los colegios públicos (36,5%) que en los privados (30,0%). Por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las estudiantes de bachiller (45,3%).

Tabla 3.3.1 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza

Alguna vez en la vida	
Total	35,2
Sexo	
Hombre	37,9
Mujer	32,9
Edad	
14 años	12,6
15 años	22,9
16 años	44,3
17 años	50,7
18 años	52,5
Titularidad	
Pública	36,5
Privada	30,0
Nivel de enseñanza	
ESO	28,2
Bachiller	45,3
F,P, Grado Medio	41,7

En cuanto al consumo de estas sustancias ilegales en los últimos 12 meses el 27,8% de los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años admiten haberlas consumido. El consumo en este periodo es muy similar entre hombres y mujeres; en general aumenta con la edad salvo en el paso de los 16 (36,3%) a los 17 (34,9%) años. Por nivel de enseñanza el consumo es mayor entre los y las estudiantes de F.P. de Grado Medio.

Tabla 3.3.2 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza

Últimos 12 meses	
Total	27,8
Sexo	
Hombre	27,6
Mujer	27,9
Edad	
14 años	7,6
15 años	16,6
16 años	36,3
17 años	34,9
18 años	53,3
Titularidad	
Pública	28,2
Privada	25,8
Nivel de enseñanza	
ESO	20,3
Bachiller	36,5
F,P, Grado Medio	42,9

Por último la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años durante los últimos 30 días es 17,7%, Al igual que sucedía en los supuestos anteriores el consumo es mayor entre hombres (20,8%) que entre mujeres (17,1%), aumenta con la edad siendo el mayor porcentaje de consumo a los 18 años (36,4%), es más frecuente en los colegios públicos (19,5%) que en los privados (15,5%) y entre el alumnado de bachiller (22,7%).

Tabla 3.3.3 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza

Últimos 30 días	
Total	17,7
Sexo	
Hombre	20,8
Mujer	17,1
Edad	
14 años	6,2
15 años	12,2
16 años	24,3
17 años	20,9
18 años	36,4
Titularidad	
Pública	19,5
Privada	15,5
Nivel de enseñanza	
ESO	15,9
Bachiller	22,7
F,P, Grado Medio	21,4

TRANQUILIZANTES

Tabla 3.4.1 Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin prescripción médica por sexo y edad

Alguna vez en la vida	
Total	10,0
Sexo	
Hombre	7,5
Mujer	12,3
Edad	
14 años	4,2
15 años	6,0
16 años	9,7
17 años	20,5
18 años	13,4

La tabla 3,4,1 nos muestra que un 10,0% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica; el consumo es mayor entre las mujeres (12,3%) que entre los hombres (7,5%) y en general aumenta con la edad salvo en el paso de los 17 (20,5%) a los 18 (13,4%) años.

Tabla 3.4.2 Prevalencias en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica por sexo y edad

Último año	
Total	4,3
Sexo	
Hombre	3,2
Mujer	5,4
Edad	
14 años	1,1
15 años	2,5
16 años	5,1
17 años	6,8
18 años	8,5

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último año alcanza al 4,3% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años, El consumo es mayor en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad hasta alcanzar el 8,5% a los 18 años.

Tabla 3.4.3 Prevalencias en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica por sexo y edad

Últimos 30 días	
Total	2,0
Sexo	
Hombre	0,4
Mujer	3,3
Edad	
14 años	1,1
15 años	1,2
16 años	1,9
17 años	3,9
18 años	2,5

En cuanto a la prevalencia del consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en los últimos 30 días es de 2,0%, Es mayor en las mujeres (3,3%) que en los hombres y aumenta con la edad, a excepción del paso de los 17 (3,9%) a los 18 (2,5%) años.

Tabla 3.4.4 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica según sexo y edad

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	15,9	10,0	9,4	4,3	5,5	2,0
Sexo						
Hombre	12,9	7,5	7,3	3,2	4,1	0,4
Mujer	18,8	12,3	11,5	5,4	6,8	3,3
Edad						
14 años	10,0	4,2	4,4	1,1	3,5	1,1
15 años	9,8	6,0	5,5	2,5	3,0	1,2
16 años	16,4	9,7	9,6	5,1	5,6	1,9
17 años	21,7	20,5	10,4	6,8	6,5	3,9
18 años	34,1	13,4	30,4	8,5	15,9	2,5

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica (tabla 3.4.4) tiene un comportamiento similar al consumo sin receta; para todos los casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad, a excepción del paso de los 17 a los 18 años para el consumo de tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida, y para el caso del consumo en los últimos 30 días.

Tabla 3.4.5 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con/sin receta médica según sexo y edad simultáneamente

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Edad en años										
Alguna vez en la vida	10,3	7,4	15,6	14,4	20,1	9,8	11,9	17,3	26,0	42,2
En el último año	3,4	3,1	9,3	10,0	13,4	5,0	7,5	10,0	10,8	40,3
En el último mes	2,9	0,7	5,7	5,5	6,7	3,9	4,9	5,4	7,1	21,2

Tabla 3.4.5.1 Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo y edad simultáneamente

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Edad en años										
Alguna vez en la vida	4,5	5,0	10,0	11,5		2,9	6,9	9,4	25,8	21,2
En el último año		0,7	6,2	4,1		1,8	4,1	4,0	8,5	13,4
En el último mes			0,4	1,5		1,8	2,3	3,4	5,3	3,9

Las tablas 3.4.5 y 3.4.5.1 representan las prevalencias en el consumo de tranquilizantes con y sin receta y sin receta médica por sexo y

edad simultáneamente, En ella podemos observar cómo el consumo es mayor en las mujeres que en los hombres, especialmente a la edad de 18 años para cada uno de los periodos considerados, Cabe reseñar en los hombres de 18 años el nulo consumo de tranquilizantes para cada uno de los periodos considerados.

Tabla 3.4.6 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	15,9	10,0	9,4	4,3	5,5	2,0
Titularidad						
Pública	15,9	10,4	9,1	3,8	5,2	2,2
Privada	17,3	9,6	11,9	6,9	7,4	1,5
Nivel de enseñanza						
ESO	12,9	8,6	6,2	3,5	3,9	1,8
Bachillerato	19,2	12,1	13,0	5,4	8,2	2,8
F,P, Grado Medio	26,7	13,3	20,0	6,7	6,7	0,0

En cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los centros privados en la categoría de alguna vez en la vida con un 17,3%; el porcentaje más bajo también lo tienen los centros privados para el periodo temporal de consumo en los últimos 30 días (1,5%)

En cuanto al nivel de enseñanza el mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la F.P. de Grado Medio (26,7%) para la categoría de haber consumido alguna vez en la vida, también en ese nivel educativo encontramos el porcentaje menor de consumo siendo nulo para el caso del consumo sin receta médica en los últimos 30 días

Tabla 3.4.7 Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica según sexo

	Vida/12 meses		12 meses/30 días		Vida/30 días	
	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN	CON/SIN	SIN
Total	58,6	42,5	55,7	47,2	34,6	19,8
Sexo						
Hombre	54,1	39,8	50,7	12,5	31,4	16,9
Mujer	61,0	43,8	58,3	61,0	36,3	26,6

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica es mayor en las mujeres para todos los periodos contemplados.

Tabla 3.4.8 Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes

	CON/SIN	SIN
Total	14,2	14,3
Sexo		
Hombre	13,4	12,2
Mujer	14,6	15,0

Finalmente la edad media en el consumo de tranquilizantes es de 14,2 años. La tabla también nos indica que el consumo se inicia antes en los chicos que en las chicas.

CANNABIS

Tabla 3.5.1 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Alguna vez	
Total	28,8
Sexo	
Hombre	30,9
Mujer	27,7
Edad	
14 años	3,9
15 años	17,1
16 años	37,1
17 años	46,9
18 años	42,7

La tabla 3.5.1 nos indica que el 28,8% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez, En general el consumo es mayor en los hombres (30,9%) que en las mujeres (27,7%) y aumenta con la edad, a excepción del paso de los 17 (46,9%) a los 18 años (42,7%); también es notorio el incremento del consumo de los 15 (17,1%) a los 16 años (37,1%).

Tabla 3.5.2 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	22,5
Sexo	
Hombre	23,5
Mujer	22,5
Edad	
14 años	3,4
15 años	13,3
16 años	30,9
17 años	33,3
18 años	35,4

El consumo de cannabis en el último año ha sido del 22,5% han consumido más los hombres que las mujeres y el consumo ha aumentado con la edad; es significativo el aumento en el paso de los 15 (13,3%) a los 16 años (30,9%).

Tabla 3.5.3 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Últimos 30 días	
Total	14,0
Sexo	
Hombre	17,5
Mujer	11,7
Edad	
14 años	2,5
15 años	9,9
16 años	19,5
17 años	18,1
18 años	20,8

Un total de 14,0% de encuestados consumió cannabis en los últimos 30 días, el consumo es mayor en los hombres que en las mujeres y aumenta conforme lo hace la edad siendo significativo el paso de los 15 (9,9%) a los 16 años (19,5%).

En la tabla 3.5.4 aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días en función de si han fumado tabaco o no en ese mismo período de tiempo.

Tabla 3.5.4 Prevalencias del consumo de cannabis en función del consumo de tabaco

Últimos 30 días		Cannabis	
		Consume	No consume
Tabaco	Consume	39,0	61,0
	No consume	3,9	96,1

La inmensa mayoría de los estudiantes (96,1%) no consumen ni tabaco ni cannabis, el 39% de ellos consumen ambas sustancias, Los no consumidores de tabaco pero sí de cannabis sólo son el 3,9%, sin embargo ascienden al 61% los que si consumen tabaco pero no cannabis.

Tabla 3.5.5 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente

	Hombre					Mujer				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Alguna vez	1,2	16,7	42,7	54,8	26,8	5,6	17,4	31,3	42,3	51,9
En el último año	0,0	13,5	33,9	37,5	20,1	5,6	13,1	27,8	30,9	44,2
En el último mes	0,0	11,0	26,1	22,2	20,1	4,1	9,0	12,6	15,6	21,2

La tabla 3.5.5 nos ofrece información sobre el consumo de cannabis por sexo y edad simultáneamente, En general el consumo es mayor en las chicas que en los chicos; llama la atención el no consumo en chicos de catorce años en el último año y el último mes frente al consumo de las chicas de esa misma edad 5,6% y 4,1% respectivamente; también es destacable el salto cuantitativo entre los 16 y 17 años en el consumo de cannabis en ambos sexos.

Las tablas 3.5.6.1, 3.5.6.2 y 3.5.6.3 muestran las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

Tabla 3.5.6.1 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Alguna vez en la vida									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	70,1	6,7	1,0	2,5	3,2	2,9	2,2	2,2	8,2
Sexo									
Hombre	69,1	8,7	0,4	3,0	2,6	2,7	2,0	2,3	9,3
Mujer	72,3	5,2	1,5	2,3	3,6	3,1	2,5	2,1	7,5
Edad									
14 años	96,1	0,9		0,6			1,4		0,9
15 años	82,9	3,5	1,1	0,7	0,7	3,5	2,8	0,8	4,0
16 años	62,9	8,4		3,8	6,4	3,2	2,9	3,0	9,5
17 años	53,1	14,0	3,9	4,6	3,8	2,7	2,2	2,2	13,5
18 años	57,3	4,9		2,5	2,5	6,1		7,4	19,5

A la vista de la tabla del consumo de cannabis alguna vez en la vida, en general, podemos comentar que los hombres (69,1%) son mayores consumidores que las mujeres (72,3%) y que el consumo aumenta con la edad hasta llegar al porcentaje del 19,5% a la edad de 18 años los que han consumido cannabis 40 días o más.

Tabla 3.5.6.2 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Últimos 12 meses por sexo y edad									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	77,1	4,7	2,1	2,9	2,0	2,9	2,9	1,6	3,5
Sexo									
Hombre	76,5	5,1	1,6	2,7	1,6	2,3	2,3	2,1	5,9
Mujer	77,5	4,6	2,6	3,1	2,4	3,4	3,5	1,2	1,7
Edad									
14 años	96,6	0,5		0,6	0,5	0,5	0,5		0,9
15 años	86,7	2,6	1,0	1,3	1,7	2,8	1,0	1,6	1,4
16 años	69,1	6,9	3,6	2,6	2,4	4,5	3,7	2,2	5,0
17 años	66,7	8,8	4,1	4,1	1,7	1,0	4,4	2,8	6,7
18 años	64,7	2,5		11,0	6,1	6,1	7,4		2,5

En la misma línea que la tabla anterior son también los hombres los mayores consumidores de cannabis en el último año, un 8,0% de éstos han consumido 20 días o más frente al 2,9% de las mujeres; también el consumo aumenta con la edad hasta alcanzar un porcentaje del 35,6% a la edad de 18 años.

Tabla 3.5.6.3 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad

Últimos 30 días								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días
Total	84,1	3,5	2,3	2,0	1,6	1,2	1,6	1,7
Sexo								
Hombre	82,5	3,3	2,7	2,2	2,1	2,3	1,7	3,3
Mujer	88,3	3,7	2,2	2,0	1,3	0,5	1,6	0,5
Edad								
14 años	97,5	0,6	0,9					0,9
15 años	90,1	3,0	1,3	0,8	0,8	1,9	1,3	0,8
16 años	80,5	5,1	2,3	3,2	3,1	0,9	1,6	3,2
17 años	82,0	5,5	1,5	1,1	1,1	2,8	4,4	1,7
18 años	79,2		11,0	7,4	2,5			

La tabla 3.5.6.3 igual que las anteriores indica el mayor porcentaje de hombres que consumen más de diez días cannabis en el último mes, un 3,06%, frente al porcentaje de mujeres que suponen un 2,1%, También, en general, el consumo aumenta con la edad.

La edad media de inicio al consumo de cannabis (tabla 3.5.7) se sitúa en los 15,0 años, sin que existan para esta sustancia diferencias significativas por razón de sexo en relación a este criterio.

Tabla 3.5.7 Edad media de inicio de consumo de cannabis

Total	15,0
Sexo	
Hombre	14,9
Mujer	15,1

COCAÍNA

Un 1,2% de estudiantes extremeños entre 14 y 18 dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, Con excepción del cannabis es, de las drogas ilegales, claramente la que muestra una mayor prevalencia respecto de su consumo, Los varones manifiestan un consumo tres veces superior al de las mujeres lo que supone una diferencia de 1,3 puntos porcentuales, Una mirada a las respuestas por edad muestra que no existe una correlación entre ésta y las tasas de consumo, de tal manera que éste aparece exclusivamente concentrado entre los 15 y los 17 años donde el 1,8% de los jóvenes extremeños reconoce haber probado alguna vez este estupefaciente.

Tabla 3.6.1 Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,2	0,6	0,4
Sexo			
Hombre	1,9	1,0	0,7
Mujer	0,6	0,4	0,1
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	1,6	1,3	0,7
16 años	1,4	0,5	0,5
17 años	1,8	0,9	0,3
18 años	0,0	0,0	0,0

El análisis del último año indica que un 0,6% de los estudiantes consultados ha consumido cocaína en ese período cifra que se reduce al 0,4% en cuanto al consumo en el último mes, Nuevamente, la prevalencia en el consumo es mayor entre los hombres si bien, El análisis por edades muestra la misma dinámica de no correlación descrita anteriormente en la prevalencia en el consumo para los últimos 12 meses aunque no así para los últimos 30 días de referencia donde se observa una ligera tendencia al incremento de los que dicen haber consumido esta droga desde los 15 hasta los 17 años.

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en polvo, podemos observar que entre la población estudiantil extremeña existen semejanzas respecto del consumo manifestado de ambas.

Al contrario que en otros lugares, entre estos estudiantes es, en general, algo mayor el consumo de cocaína base, Únicamente si particularizamos temporalmente vemos que ese consumo se invierte levemente entre los varones para los últimos 11 meses, por una parte, y, por otra, para aquellos que tienen 17 años (con independencia de su sexo), entre los que el consumo de cocaína en polvo es algo mayor y entre los que no se percibe consumo alguno de base en el último año, Así, si la franja de los 17 se visualiza una mayor prevalencia de consumo de la cocaína en polvo en la de los 15 es algo mayor el uso de base por la suma de consumidores hombres y mujeres.

Tabla 3.6.2.1 Prevalencias del consumo de base según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,3	0,6	0,5
Sexo			
Hombre	2,0	0,8	0,8
Mujer	0,7	0,3	0,1
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	2,1	1,2	0,9
16 años	1,8	0,7	0,7
17 años	1,2	0,0	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

Tabla 3.6.2.2 Prevalencias del consumo de cocaína en polvo según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,1	0,7	0,3
Sexo			
Hombre	1,7	1,0	0,5
Mujer	0,5	0,4	0,0
Edad			
14 años			
15 años	0,9	1,2	0,3
16 años	1,1	0,2	0,2
17 años	2,0	1,6	0,4
18 años			

Resulta revelador el análisis de la tabla 3.6.5 en la que se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjuntamente.

Tal como se acaba de indicar, en general, se observa que el consumo de cocaína base es ligeramente mayor, lo mismo entre hombre que entre mujeres si bien no en todas las edades, La punta de consumo de cocaína base se observa entre los varones de 16 y, sobre todo, 17 años (3,3%) y entre las mujeres de 15 (2,2%), Por su parte, el consumo de cocaína en polvo es más elevado a los 17 (2,2% de hombres y 1,9% de mujeres).

Tabla 3.6.3 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,0	2,0	3,1	3,3	0,0	0,0	2,2	0,5	0,0	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,0	2,2	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,0	1,6	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	1,6	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto del hábito manifestado para alguna vez en la vida, el último año y el último mes.

Tabla 3.6.4.1 Frecuencia en el consumo de cocaína base alguna vez en la vida según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	98,7	0,8	0,3				0,1		0,1
Sexo									
Hombre	97,9	1,1	0,7				0,2		0,2
Mujer	99,4	0,6							
Edad									
14 años	100,0								
15 años	97,9	1,4	0,4						0,3
16 años	98,3	0,8	0,6				0,2		
17 años	98,9	1,1							
18 años	100,0								

Para el consumo asociado a la cocaína base, vemos cómo la mayoría de los que probaron esta sustancia lo hizo únicamente un día y algún varón incluso dos y poco más.

Tabla 3.6.4.2 Frecuencia en el consumo de cocaína base los últimos 12 meses según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	99,4	0,2	0,3						0,1
Sexo									
Hombre	100,0								
Mujer	99,7								
Edad									
14 años	100,0								
15 años	98,6	0,7	0,4						0,3
16 años	99,4		0,6						
17 años	100,0								
18 años	100,0								

Tabla 3.6.4.3 Frecuencia en el consumo de cocaína base los últimos 30 días según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,5	0,1	0,3	0,1				
Sexo								
Hombre	100,0							
Mujer	99,9							
Edad								
14 años	100,0							
15 años	99,0	0,3	0,4	0,3				
16 años	99,4		0,6					
17 años	100,0							
18 años	100,0							

Si hablamos de cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de consumo manifestado está entre uno y dos días para en la vida y en los últimos 12 meses y dos días para los escasos casos observados de consumo en el último mes.

Tabla 3.6.4.4 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo alguna vez en la vida según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	98,9	0,5	0,4		0,1				0,1
Sexo									
Hombre	98,3	0,9	0,4		0,2				0,2
Mujer	99,4	0,1	0,4						
Edad									
14 años	100,0								
15 años	98,9	0,4	0,4						0,3
16 años	98,9	0,8	0,2						
17 años	97,6	0,6	1,3		0,6				
18 años	100,0								

Tabla 3.6.4.5 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo los últimos 12 meses según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	99,3	0,3	0,2		0,1		0,1		
Sexo									
Hombre	98,9	0,7			0,2		0,2		
Mujer	99,6		0,4						
Edad									
14 años	100,0								
15 años	98,9	0,8					0,3		
16 años	99,7	0,3							
17 años	98,1		1,3		0,6				
18 años	100,0								

Tabla 3.6.4.6 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo los últimos 30 días según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,7		0,2					0,1
Sexo								
Hombre	99,4		0,4					0,2
Mujer	100,0							
Edad								
14 años	100,0							
15 años	99,7		0,3					
16 años	99,7							0,3
17 años	99,4		0,6					
18 años	100,0							

La edad media de los encuestados en su inicio al consumo de cocaína es de 16 años, edad que casi coincide con la de inicio al consumo de cocaína base pero no a la de cocaína polvo, un año inferior, Tanto de la cocaína, en general, como de sus variantes, la mujer es casi un año y medio más precoz que el varón en un primer uso.

Tabla 3.6.5 Edad media de inicio al consumo de cocaína

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	16,2	15,1	16,0
Sexo			
Hombre	16,5	15,8	16,3
Mujer	15,0	14,0	15,0

HEROÍNA

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes extremeños consultados es testimonial oscilando entre el 0,4% en algún momento de sus vidas y el 0,1% en el último mes, Por sexos, dicho consumo es ligerísimamente mayor entre los hombres (una décima porcentual), En lo que se refiere a la edad, el consumo se circunscribe a los 15 años con algún caso a los 16.

Tabla 3.7 Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,4	0,2	0,1
Sexo			
Hombre	0,5	0,3	0,2
Mujer	0,4	0,1	0,1
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	1,2	0,9	0,6
16 años	0,5	0,0	0,0
17 años	0,0	0,0	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

SPEED / ANFETAMINAS

Un 0,6% del alumno extremeño de referencia dice haber consumido alguna vez en su vida seep o anfetaminas, con una proporción de varones el doble que de mujeres y un consumo ubicado básicamente en los 16 años sin que exista relación entre éste y la edad, En realidad se trata de un consumo muy aislado y ocasional que apenas si tiene reflejo en el último año y menos aún en el último mes, donde algún chico probó estas drogas un solo días, tal como se muestra en la tabla 3.8.5.

Tabla 3.8.1 Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,6	0,1	0,1
Sexo			
Hombre	0,8	0,3	0,2
Mujer	0,4	0,0	0,0
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	0,3	0,0	0,0
16 años	1,1	0,0	0,0
17 años	0,4	0,8	0,4
18 años	0,0	0,0	0,0

La edad media con que estos pocos chicos dicen haber probado estas drogas es de 15,7 años, algo ligeramente mayor entre las mujeres.

Tabla 3.8.2 Edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas

Total	15,7
Sexo	
Hombre	15,5
Mujer	16,0

Tabla 3.8.3 Frecuencia en el consumo de speed/anfetaminas los últimos 30 días según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,9	0,1						
Sexo								
Hombre	99,8	0,2						
Mujer	100,0	0,0						
Edad								
14 años	100,0	0,0						
15 años	100,0	0,0						
16 años	100,0	0,0						
17 años	99,6	0,4						
18 años	100,0	0,0						

ALUCINÓGENOS

Tal como ocurre con el seep o las anfetaminas, el consumo de alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años resulta poco frecuente, Únicamente un 0,5% dice haberlo consumido alguna vez, con una prevalencia bastante similar entre chicos y chicas así como, salvo a en los 18 años, donde no se observa ningún caso, en las edades comprendidas entre 14 y 17 años.

Se trata de consumo que básicamente puede circunscribirse al último año y, en concreto, a los últimos 11 meses dado que ningún encuestado dice haberlo hecho en los últimos 30 días.

Tabla 3.9.1 Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,5	0,4	0,0
Sexo			
Hombre	0,5	0,5	0,0
Mujer	0,4	0,1	0,0
Edad			
14 años	0,5	0,5	0,0
15 años	0,6	0,3	0,0
16 años	0,5	0,5	0,0
17 años	0,4	0,4	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos es de 15,1 años, si bien al contrario que con otras sustancias las mujeres se inician antes casi dos años antes que los varones.

Tabla 3.9.2 Edad media de inicio al consumo de alucinógenos

Total	15,1
Sexo	
Hombre	15,7
Mujer	14,0

INHALABLES VOLÁTILES

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, el consumo entre los jóvenes estudiantes de secundaria extremeños no alcanza el 1% (0,9), cifra que desciende al 0,6 y 0,3% en los últimos año y mes, respectivamente.

Estamos, pues, cuantitativa, pero también cualitativamente hablando en términos de ubicación social, ante otras de esas sustancias que, como las últimas, podemos calificar de marginales.

El consumo es algo mayor entre chicos que entre chicas y el pico más alto de prevalencia se observa a los 14, si bien la edad en el grupo considerado no es una variable que parezca influir en absoluto en la ingesta de este tipo de sustancias, De hecho, no se manifiesta consumo alguno entre los encuestados de 18 años.

La totalidad de los consumidores varones probaron algún inhalable en el último año y la mitad de éstos en el último mes, En el caso de las chicas, el grueso del consumo fue previo a estos 12 últimos meses, justamente lo mismo que se observa para los 14 años.

Tabla 3.10.1 Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,9	0,6	0,3
Sexo			
Hombre	1,0	1,0	0,5
Mujer	0,7	0,1	0,2
Edad			
14 años	1,4	0,0	0,0
15 años	0,9	0,6	0,3
16 años	0,5	0,7	0,5
17 años	0,8	0,4	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

La edad media de inicio al consumo de inhalables a los 12,8 años es el más temprano entre las llamadas drogas ilegales “duras” y en el caso de las chicas esta edad es aún algo menor (12,5 años).

Tabla 3.10.2. Edad media de inicio al consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

Total	12,8
Sexo	
Hombre	13,0
Mujer	12,5

La frecuencia de consumo de inhalables derivada de las respuestas de estos alumnos extremeños en el último mes indica que estaríamos ante hábitos de consumo meramente episódicos con algún caso con uno o tres días y nunca más de seis o nueve.

Tabla 3.10.3 Frecuencia en el consumo de sustancias volátiles según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,8	0,1		0,1		0,1		
Sexo								
Hombre	99,5	0,2		0,2		0,2		
Mujer	100,0	0,0		0,0		0,0		
Edad								
14 años	0,0	0,0		0,0		0,0		
15 años	99,7	0,0		0,3		0,0		
16 años	95,5	0,2		0,0		0,2		
17 años	100,0	0,0		0,0		0,0		
18 años	99,8	0,1		0,1		0,1		

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El éxtasis y las drogas de diseño son las sustancias menos consumidas entre los estudiantes de Extremadura encuestados, Únicamente dos chicos, el 0,1% de la muestra, dice haberlas probado en alguna ocasión, uno de ellos, de 15 años, en el último mes, Podría pensarse, por tanto, que estamos ante un tipo de droga que ya no esté de moda entre estos jóvenes posiblemente porque otras, de mayor valoración y de más fácil acceso, haya ocupado su lugar.

Tabla 3.11.1 Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,1	0,1	0,1
Sexo			
Hombre	0,2	0,3	0,2
Mujer	0,0	0,0	0,0
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	0,3	0,3	0,3
16 años	0,2	0,2	0,0
17 años	0,0	0,0	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

Tabla 3.11.2 Frecuencia en el consumo de éxtasis y otras drogas de diseño según sexo y edad

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,9	0,1						
Sexo								
Hombre	99,8	0,2						
Mujer								
Edad								
14 años								
15 años	99,7	0,3						
16 años								
17 años								
18 años								

GHB

Como en el caso del éxtasis, el GHB o éxtasis líquido, es una droga de escasa presencia entre los encuestados, Cinco estudiantes, 3 chicos (dos de 15 años y uno de 16) y 2 chicas (una de 15 y otra de 16) dicen haberlo probado en alguna ocasión, lo que supone una prevalencia en el consumo de esta sustancia del 0,4%.

Tabla 3.12.1 Prevalencias del consumo de ghb según sexo y edad

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	0,4	0,2	0,1
Sexo			
Hombre	0,5	0,3	0,2
Mujer	0,3	0,0	0,0
Edad			
14 años	0,0	0,0	0,0
15 años	1,2	0,6	0,3
16 años	0,5	0,0	0,0
17 años	0,0	0,0	0,0
18 años	0,0	0,0	0,0

En el caso de los chicos el consumo manifestado es más reciente (último año, con uno de ellos en el último mes) que el de las chicas ya que ninguna de ellas dice haber probado el GHB en el último año.

Tabla 3.12.2 Prevalencias del consumo de ghb según sexo y edad simultáneamente

	GHB									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumo últimos 30 días	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Respecto de la edad del primer consumo, señalar que, con los datos de la muestra, únicamente se puede establecer la edad de las mujeres dado que los varones que dicen haber probado el GHB no indican sus años.

POLICONSUMO

Las siguientes tablas, 3.13.1 a 3.13.3, muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, el último año y el último mes, Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas, Así, por ejemplo, entre

los consumidores de tabaco, el 96,6% dicen haber probado alguna vez el alcohol, el 55,1% el hachís o la marihuana o el 16% los tranquilizantes.

Por la prevalencia en su uso, el consumo combinado pivota fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, el cannabis, No solo porque buena parte de los consumidores de otras sustancias menos frecuentadas lo son también de éstas, sino porque se observa, además, la estrecha relación en el consumo de las mismas, de tal manera que muchos usuarios de alguna de ellas lo son de las otras dos, Es cierto, no obstante, que los que dicen fumar o haber fumado tabaco en alguna ocasión tienen un mayor contacto con el alcohol y los cannabinóicos que los que dicen haber probado el alcohol éstos y con el tabaco.

Tabla 3.13.1 Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S, Volátiles	G hb	Tranqu,	Tranqu, sin
Tabaco		96,6	55,1	0,2	1,1	1,3	1,1	1,6	0,5	0,2	0,0	16,0	11,2
Alcohol	61,3		36,9	0,0	0,7	0,8	0,7	0,8	0,2	0,3	0,0	14,4	8,8
Hachís	93,3	99,7		0,0	2,1	2,1	1,2	1,5	0,3	0,6	0,0	18,6	13,4
Éxtasis	100	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	100	100	100	0,0		14,3	0,0	33,3	16,7	14,3	0,0	25,0	0,0
Speed	100	100	87,5	0,0	12,5		0,0	37,5	0,0	20,0	0,0	37,5	12,5
Coca base	100	100	57,1	0,0	0,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coca polvo	100	100	83,3	0,0	22,2	30,0	12,5		10,0	12,5	0,0	66,7	55,6
Heroína	100	100	50,0	33,3	33,3	0,0	0,0	33,3		0,0	0,0	100	100
S, Volátiles	12,5	42,9	25,0	0,0	12,5	14,3	0,0	12,5	0,0		12,5	12,5	0,0
Ghb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100		0,0	0,0
Tranqu,	57,0	83,9	37,0	0,0	0,6	1,8	0,0	3,6	0,6	0,6	0,0		57,3
Tranqu, sin	68,0	83,7	49,4	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	89,6	

Tabla 3.13.2 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	G h b	Tranqu,	Tranqu, sin
Tabaco		97,7	56,9	0,2	1,1	0,7	1,1	2,3	0,7	0,7	0,5	14,9	10,2
Alcohol	81,9		34,2	0,1	0,6	0,3	0,8	0,9	0,3	0,7	0,1	12,1	6,0
Hachís	91,2	96,7		0,3	1,6	1,0	2,3	2,6	0,6	1,3	0,3	16,0	11,1
Éxtasis	50,0	50,0	100		100	0,0	100	100	50,0	50,0	100	0,0	50,0
Alucinógenos	83,3	83,3	100	33,3		25,0	20,0	50,0	16,7	40,0	20,0	0,0	16,7
Speed	100	100	100	0,0	50,0		0,0	100	0,0	100	0,0	50,0	50,0
Coca base	100	100	100	14,3	14,3	0,0		28,6	28,6	0,0	14,3	0,0	0,0
Coca polvo	100	88,9	88,9	10,0	22,2	11,1	22,2		10,0	11,1	22,2	30,0	30,0
Heroína	100	100	100	50,0	50,0	0,0	100	50,0		0,0	50,0	33,3	33,3
S. Volátiles	75,0	85,7	57,1	12,5	28,6	16,7	0,0	16,7	0,0		0,0	16,7	12,5
Ghb	100	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	100	50,0	0,0		0,0	0,0
Tranq,	80,5	91,3	38,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,4	0,8	0,8	0,0		45,4
Tranq, Sin	88,2	96,3	59,6	1,7	1,8	1,8	0,0	5,4	1,7	1,8	0,0	100	

Tabla 3.13.3 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinógenos	Speed	Coca base	Coca polvo	Heroína	S. Volátiles	G h b	Tranqu,	Tranqu, sin
Tabaco		89,6	40,4	0,3	0,0	0,3	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	7,6	4,2
Alcohol	86,6		22,0	0,1	0,0	0,1	0,6	0,5	0,3	0,5	0,1	6,2	3,0
Hachís	99,4	89,5		0,5	0,0	0,5	3,2	1,1	1,0	0,5	0,5	6,4	3,2
Éxtasis	100	100	100		0,0	0,0	100	100	100	0,0	100	0,0	0,0
Alucinógenos	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Speed	100	100	100	0,0	0,0		0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coca base	100	83,3	100	17,6	0,0	0,0		16,7	33,3	0,0	16,7	0,0	0,0
Coca polvo	100	100	66,7	25,0	0,0	33,3	50,0		25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Heroína	100	100	100	50,0	0,0	0,0	100	50,0		0,0	50,0	0,0	0,0
S. Volátiles	100	100	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25,0	0,0
Ghb	100	100	100	100	0,0	0,0	100	100	100	0,0		0,0	0,0
Tranq,	87,9	70,6	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0		36,5
Tranq, Sin	80,0	100	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	

Aunque a gran distancia, los tranquilizantes, más cuando son sin receta, aparecen entre las sustancias que algunos de los consumidores de otras drogas han probado alguna vez a lo largo de su vida, En el último mes esa relación se ciñe, si bien de forma discreta (entre un 3 y 4%) solo a aquellos que dicen fumar tabaco o cannabis o tomar alcohol.

Respecto de lo que son las llamadas drogas ilegales, los perfiles más claros de policonsumo se producen en torno a la heroína, las anfetaminas o speed y la cocaína, especialmente en polvo, si bien hay que tener presente el escaso número de quienes dicen consumir estas sustancias, sobre todo en el último año o el último mes.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

Tabla 3.14.1 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	20,4
Sexo	
Hombre	20,8
Mujer	20,1
Edad	
14 años	3,5
15 años	12,0
16 años	25,0
17 años	31,1
18 años	32,9

La tabla 3.14.1 nos ofrece información del consumo concomitante de alcohol y cannabis estimado para Extremadura por sexo y edad. En los últimos 12 meses un 20,4% de los y las estudiantes han consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión, Por sexos el porcentaje es muy similar tanto en hombres como en mujeres. El aumento del consumo está muy ligado a la edad que aumenta conforme lo hace ésta pasando de un 3,5% a la edad de 14 años a un 32,9% a la edad de 18 años.

Tabla 3.14.2 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según sexo y edad simultáneamente

Últimos 12 meses	
Hombre	
14 años	1,6
15 años	11,2
16 años	26,5
17 años	38,9
18 años	20,1
Mujer	
14 años	4,8
15 años	12,7
16 años	23,4
17 años	26,5
18 años	40,3

El consumo conjunto de alcohol y cannabis en el último año por sexo y edad conjuntamente indica que, en general, el consumo aumenta con la edad en ambos sexos a excepción del paso de los 17 (38,9%) a los 18 (20,1%) años en el caso de los hombres. Para las mujeres el aumento es constante en todas las edades, especialmente significativo es el aumento de los 17 (26,5%) a los 18 (40,3%) años.

Tabla 3.14.3 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cannabis según titularidad y nivel de enseñanza

Total	20,8
Titularidad	
Pública	20,8
Privada	17,3
Nivel de enseñanza	
ESO	16,6
Bachiller	21,5
F,P,Grado Medio	40,0

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos (20,8%) que en los colegios privados (17,3%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 40% del alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias.

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

Tabla 3.15.1 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad

Últimos 12 meses	
Total	2,3
Sexo	
Hombre	3,4
Mujer	1,4
Edad	
14 años	0,0
15 años	2,1
16 años	2,1
17 años	3,8
18 años	6,1

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años fue del 2,3%. La prevalencia del consumo es mayor entre los hombres (3,4%) que entre las mujeres (1,4%). Con respecto a la edad la tabla 3.15.1 muestra como el consumo conjunto de ambas sustancias aumenta con la edad, siendo nulo a la edad de 14 años y máximo (6,1%) a la edad de 18 años.

Tabla 3.15.2 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y edad simultáneamente

Últimos 12 meses	
Hombre	
14 años	0,0
15 años	2,4
16 años	3,3
17 años	10,4
18 años	0,0
Mujer	
14 años	0,0
15 años	1,3
16 años	0,9
17 años	0,0
18 años	9,6

Analizando el consumo conjunto de ambas sustancias en el último año por sexo y edad respectivamente, observamos cómo es nulo para la edad de 14 años en ambos sexos. En el caso de los hombres aumenta progresivamente hasta la edad de 18 años momento en el que vuelve a ser nulo el consumo de ambas sustancias. En el caso de las mujeres también aumenta conforme a la edad a excepción de los 17 años en el que el consumo conjunto es cero.

Tabla 3.15.3 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína por titularidad y nivel de enseñanza

Últimos 12 meses	
Total	2,3
Titularidad	
Pública	2,4
Privada	2,2
Nivel de enseñanza	
ESO	2,6
Bachiller	1,1
F,P,Grado Medio	6,7

En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto de ambas sustancias en los últimos 12 meses, es ligeramente mayor en los colegios públicos (2,4%) que en los privados (2,2%). Con respecto al nivel de enseñanza el consumo es mayor entre el alumnado de F.P. de Grado Medio, alcanzando un 6,7%.

4. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a través de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a los problemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse, En este sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de problemas que pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de sustancias y los ligados a un consumo habitual de las mismas.

La tabla siguiente indica en términos relativos el número de estudiantes que considera que consumir como máximo una vez al mes determinadas sustancias puede conllevar muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo.

Los resultados se han ordenado en orden descendente, es decir, de aquella sustancia percibida por mayor número de jóvenes como más gravosa a la que menos.

Tabla 4.1.1 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)

Inyectarse	65,0
Heroína	61,4
Base	60,6
Cocaína (polvo)	59,4
Ghb	58,6
Éxtasis	58,3
Speed	58,1
Alucinógenos	57,4
Cannabis	46,8
Tranquilizantes	34,9
Tabaco	32,4

Respecto de un consumo esporádico, los jóvenes extremeños sujetos del estudio entienden que las drogas más perjudiciales son

aquellas que se toman inyectándose (65%), como la heroína (61,4%), además de la cocaína (sobre un 60%, en las dos variedades tratadas), En realidad, salvo el consumo de tabaco (32%), tranquilizantes (34,9) y cannabáceos (46,8), el de todas las demás sustancias es percibido como bastante o muy problemático para al menos dos de cada tres estudiantes, Visto a la inversa, podría considerarse que son muchos los jóvenes extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático, Podría hablarse que, como mínimo, cuatro de cada diez de ellos, Ello podría significar, por un lado, que ciertos consumos, cuando son moderados, tienden a una progresiva normalización en términos sociales y subculturales, o, por otro, que los jóvenes, o bien no están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a ciertos mensajes en esta materia, En el caso de las drogas socialmente más aceptadas, el alcohol y el tabaco (dos de cada tres encuestados opina un uso moderado de ellas resulta poco o nada problemático) y, entre las ilegales, cada vez más el cannabis, es algo evidente.

Tabla 4.1.2 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	65,0	63,4	66,2	61,8	62,8	65,1	68,4	69,4
Heroína	61,4	59,4	63,0	56,8	60,4	60,2	66,5	67,3
Base	60,6	57,3	63,2	55,7	61,5	59,6	65,2	61,8
Cocaína (polvo)	59,4	56,9	61,2	54,2	59,5	58,6	62,3	64,5
Ghb	58,6	57,7	59,3	54,7	58,0	56,6	64,0	64,5
Éxtasis	58,3	56,3	59,9	54,9	57,5	56,9	62,0	64,5
Speed	58,1	56,7	59,2	54,5	57,5	57,2	60,2	64,5
Alucinógenos	57,4	56,4	58,2	54,5	55,7	57,4	59,1	64,5
Cannabis	46,8	43,8	49,1	50,0	54,1	42,7	42,0	46,4
Tranquilizantes	34,9	32,7	36,6	31,6	40,2	31,5	35,7	36,4
Tabaco	32,4	31,7	33,0	34,3	34,4	28,1	27,6	50,0

Tratadas las opiniones del alumnado en forma de forma de respuesta múltiple, es decir, las drogas en conjunto, sin especificar, encontramos que algo más de la mitad de los jóvenes encuentran que su consumo esporádico es o puede ser bastante o muy problemático y uno de cada tres muy problemático, Dos de cada diez, en cambio, opina que dicho consumo resulta poco problemático.

La percepción de un riesgo elevado asociado al consumo no habitual de drogas es algo mayor entre las chicas en todas las sustancias consideradas (la única excepción lo es el para el tabaco como causante de muchos problemas) y, en general, se observa una correlación directa en términos de edad, de tal manera que, a más edad, más crítico se es con el uso de esos estupefacientes. Así, mientras la heroína es vista como problemática para un 56,8% de jóvenes de 14, lo es también, en cambio, para un 67,3% de los de 18, Lo mismo ocurre con otras drogas, La excepción, nuevamente, está respecto del tabaco, el cannabis y los tranquilizantes, cuyos consumos aumentan progresivamente con los años a la par que se estabiliza o no difiere mucho la percepción sobre su iniquidad.

En general, las consideraciones anteriores respecto de la percepción del consumo ocasional de drogas se confirman cuando se lo relaciona a la generación de muchos problemas, En este caso podríamos hablar de una horquilla que oscila entre los cuatro de cada diez jóvenes que así lo perciben respecto de las drogas inyectables y el uno de cada diez respecto del tabaco, De esta manera, seis de cada diez de estos estudiantes no entienden que un consumo esporádico sea altamente problemático, casi tres de cada cuatro en el caso del hachís y la marihuana, casi cuatro de cada cinco en el caso de los tranquilizantes y, como se acaba de señalar, casi nueve de cada diez respecto del tabaco.

No obstante estos datos relativos al número de alumnos que consideran que el uso esporádico de las drogas es o puede resultar bastante o muy problemático, habría que destacar que al menos uno de cada cuatro dice no saber las consecuencias del consumo de las drogas sobre las que se les pregunta, En el caso del cannabis (dos de cada diez dice no saber) y del tabaco (uno de cada diez) las opiniones están más claras.

Tabla 4.1.3 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	44,2	44,1	44,3	39,2	46,8	41,7	45,5	53,2
Heroína	41,4	40,0	42,5	37,1	41,7	37,5	45,0	56,4
Ghb	39,7	39,5	39,8	34,4	42,0	33,8	45,6	53,6
Éxtasis	39,5	38,7	40,0	36,6	40,7	33,9	43,8	53,6
Base	39,4	36,3	41,9	34,3	41,2	36,0	44,7	46,4
Speed	38,9	38,0	39,5	36,2	40,1	33,1	43,0	53,6
Alucinógenos	38,4	37,1	39,4	32,4	39,2	36,2	40,9	50,9
Cocaína (polvo)	38,0	37,4	38,6	34,1	37,8	33,9	44,7	47,3
Cannabis	28,0	24,3	30,9	28,8	32,4	23,9	29,0	28,2
Tranquilizantes	18,4	19,3	17,7	16,5	22,5	16,2	16,4	21,8
Tabaco	13,8	14,6	13,2	13,1	12,6	12,3	13,4	25,5

Si tenemos en cuenta el consumo de determinadas sustancias de manera habitual, es decir, aproximadamente una vez por semana o con una mayor frecuencia, los estudiantes extremeños indican que dicho consumo puede causar bastantes o muchos problemas en el número que aparece en la tabla 4.1.4.

Tabla 4.1.4 Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)

Tabaco (un paquete diario)	80,7
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	75,6
Cannabis	73,7
Base	72,4
Inyectarse	71,7
Cocaína (polvo)	71,0
Heroína	70,3
Éxtasis	69,4
Speed	68,6
Alucinógenos	68,5
Ghb	68,2
Tranquilizantes	65,1
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	46,2
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	38,4

Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando el señalado desde el 80,7% de los estudiantes para el caso de fumar un paquete diario de tabaco al 38,4%, para el caso de una ingesta de alcohol el fin de semana equivalente a más de cinco copas o cañas, Siendo más precisos, vemos que, salvo en el caso del consumo de alcohol, casi siete o más de cada diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un uso habitual de las drogas, Cuando de alcohol se trata, el consumo diario es visto como potencial origen de problemas para casi la mitad de los encuestados y el consumo semanal, como se ha señalado, para cuatro de cada diez.

Una lectura de los datos, otra vez, desde la perspectiva de un consumo, en este caso, habitual que no causa problemas o que minimiza los causados, pone negro sobre blanco el crédito social del alcohol al punto de que muchos jóvenes (entre cuatro y cinco de cada diez) no sienten que tomarlo, siempre que no sea de manera abusiva a diario, sea pernicioso, En el caso del tabaco y del cannabis esa cifra desciende al 8%, algo que parece contrastar con el creciente arraigo de estas sustancias entre los jóvenes.

Tratadas nuevamente las opiniones del alumnado en forma de forma de respuesta múltiple, encontramos que siete de cada diez jóvenes encuentran que su consumo habitual es o puede ser bastante o muy problemático y la mitad muy problemático, Tan solo uno de cada diez opina que dicho consumo es poco problemático.

Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de un riesgo elevado asociado al consumo habitual de drogas es mayor entre las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión, También se observa una cierta correlación en términos de edad, generalmente hasta los 17 años, paralela al grado de información de los jóvenes que puede deducirse de las respuestas marcadas como “no sabes”, Podría decirse que, con los años, éstos forman su opinión y, con ella, una percepción más real de los problemas que del consumo de drogas podrían derivarse.

Tabla 4.1.5 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Tabaco (un paquete diario)	80,7	75,6	84,6	71,6	79,5	81,4	86,9	85,5
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	75,6	69,8	80,2	64,0	73,3	80,0	75,9	86,5
Cannabis	73,7	70,4	76,3	63,6	71,8	76,8	75,8	80,2
Base	72,4	69,5	74,8	61,7	70,2	75,5	78,7	73,0
Inyectarse	71,7	69,0	73,8	65,0	68,5	74,1	77,8	71,8
Cocaína (polvo)	71,0	68,8	72,8	62,4	68,3	73,5	78,1	71,8
Heroína	70,3	67,8	72,2	62,6	67,0	73,3	75,7	72,1
Éxtasis	69,4	66,3	71,8	58,7	65,0	74,0	75,2	71,8
Speed	68,6	66,4	70,4	58,4	63,9	72,5	75,6	71,8
Alucinógenos	68,5	67,4	69,4	60,0	63,9	71,3	75,6	72,1
Ghb	68,2	66,3	69,8	59,6	63,7	70,9	76,7	69,4
Tranquilizantes	65,1	61,6	67,8	57,1	62,2	70,3	65,6	68,5
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	46,2	40,6	50,5	38,0	47,0	45,4	52,5	47,7
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	38,4	33,8	42,1	40,1	39,9	40,3	29,7	42,7

Si atendemos al consumo frecuente de drogas como causante, exclusivamente, de muchos problemas, encontramos que al menos la mitad de los estudiantes extremeños percibirían ese riesgo para todas las sustancias consideradas excepto para los tranquilizantes (uno de cada tres) y la ingesta moderada de alcohol a diario (15%) y el fin de semana (uno de cada diez).

Por el contrario, algo más de uno de cada cinco (22,4%) declara no saber qué grado de problemas puede derivarse de ese uso habitual de las sustancias sobre las que se los interroga, El desconocimiento mayor se observa en torno a drogas como el GHB, speed, éxtasis o heroína (aproximadamente uno de cada tres) y es menos relevante, como cabría esperar, respecto de los cannabáceos (18%) y las drogas legales (en torno al 14% para el alcohol y 11% para el tabaco).

Tabla 4.1.6 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Inyectarse	62,6	62,5	62,8	55,1	58,6	67,2	63,0	70,9
Base	61,2	60,0	62,3	52,8	59,6	66,4	66,0	51,4
Heroína	60,4	59,9	60,7	51,9	56,8	65,7	62,6	62,2
Cocaína (polvo)	59,6	59,1	60,0	52,1	56,2	62,9	60,3	70,9
Speed	58,5	58,4	58,5	46,7	52,1	64,2	62,4	68,2
Éxtasis	58,0	57,4	58,4	47,4	53,8	64,4	58,7	64,5
Alucinógenos	57,1	58,5	56,1	50,5	50,9	62,3	59,9	62,2
Ghb	57,1	57,1	57,0	49,8	51,7	61,2	60,8	62,2
Cannabis	50,0	47,0	52,5	50,9	52,6	52,4	46,7	37,8
Tabaco (un paquete diario)	49,3	46,6	51,5	43,1	50,2	47,1	56,3	51,8
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día)	47,7	44,5	50,3	38,9	49,8	53,2	51,9	27,0
Tranquilizantes	34,6	33,4	35,5	28,3	38,4	35,4	35,2	30,6
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	15,7	14,5	16,7	18,3	16,5	15,1	11,5	19,8
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	10,0	9,3	10,7	13,5	10,5	8,3	8,9	10,9

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

Cuando se habla de consumo de drogas, resulta fundamental saber la facilidad que los sujetos del estudio tienen para poder disponer de ellas, En este caso, la encuesta establece una escala que va desde la casi imposibilidad a la mucha facilidad en caso de querer obtener alguna de las sustancias por las que se pregunta.

En la tabla siguiente hemos ordenado de mayor a menor los porcentajes de alumnos extremeños de 14 a 18 años que consideran que les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguir determinadas drogas, Como puede observarse, respecto de las llamadas legales, alcohol y tabaco, más de ocho de cada diez alumnos entiende que disponer de ellas es sencillo a partir de los 15 años (cuando aún no es legal adquirirlas por sí mismos), nueve de cada diez a partir de los 16 y la

totalidad a los 18, Para 6 de cada diez jóvenes de 14 años no es complicado conseguir alcohol o tabaco.

La facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad en el reto de sustancias, desde el 47,6% de alumnos en el caso del cannabis al 13% para la heroína, la droga, según ellos, más difícil de obtener.

Tabla 4.2.1 Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)

	Total	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Alcohol	84,7	84,5	84,9	59,9	82,2	91,4	90,7	100,0
Tabaco	83,8	84,6	83,0	57,1	80,2	90,4	92,6	100,0
Cannabis	47,6	47,6	47,7	20,1	37,4	56,9	62,6	62,2
Tranquilizantes	37,1	36,5	37,7	26,1	30,7	40,1	44,5	50,0
Base	21,4	21,1	21,6	13,2	16,4	25,3	19,1	41,4
Cocaína (polvo)	20,2	19,8	20,5	13,3	14,8	22,8	20,1	39,0
Alucinógenos	16,3	18,2	14,7	13,3	12,8	19,0	10,8	32,9
Seep	16,1	17,6	14,8	9,6	11,0	21,9	12,5	28,0
Éxtasis	14,3	16,1	13,0	11,6	9,8	18,2	6,1	35,4
Heroína	13,8	14,3	13,4	12,2	11,0	15,9	8,4	28,0
Ghb	13,0	13,9	12,3	11,1	9,5	14,9	7,8	30,5

En general, las drogas ilegales percibidas como de más difícil acceso (alucinógenos, éxtasis, speed, GHB y heroína, por este orden), resultan más difíciles de conseguir para las chicas que para los chicos, mientras para el resto de sustancias (tranquilizantes, cocaína y cannabis), ellas indican una accesibilidad ligeramente mayor.

Si tomamos los datos desde el punto de la práctica imposibilidad para conseguir cualquiera de estas sustancias, llama la atención el bajo número de alumnos que marcan esta opción, Menos de 2 de cada diez, respecto de todas las drogas, En concreto, desde el 17% respecto de la heroína, del GHB o de los alucinógenos hasta el 9,1 del cannabis, 2,7 del tabaco o 1,5 del alcohol, En realidad, ninguna de las drogas sobre las que se pregunta es de difícil acceso para una mayoría de encuestados, Solo cuatro de cada diez, aproximadamente, dicen que obtener GBH, éxtasis, heroína, alucinógenos, speed o cocaína les resultaría difícil o

prácticamente imposible, uno de cada cuatro tranquilizantes o cannabis, y uno de cada veinte alcohol o tabaco.

La conclusión evidente es que no parece que la mayoría de alumnado tenga dificultades para acceder a las drogas, obviamente las legales, pero también las ilegales.

Esa percepción, en general, se leva con la edad de los jóvenes, En efecto, los datos corroboran una correlación de signo positivo entre la disponibilidad percibida por el alumnado respecto de las drogas y sus edades, de tal manera que a más edad más fácil acceso real o potencias a las mismas, La correlación entre las dos variables sería bastante significativa en el caso del cannabis, alcohol y tabaco y menor en el caso de la heroína.

5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo, Concretamente, un 38,1% dice sentirse perfectamente informado y un 39,6% suficientemente informado, Tan solo uno de cada 25 declara sentirse mal informado.

Tabla 5.1 Información recibida sobre el consumo de drogas

Perfectamente informado	38,1
Suficientemente informado	39,6
Informado a medias	18,5
Mal informado	3,8

Tabla 5.2 Información recibida sobre el consumo de drogas

	Mal informado	Perfectamente informado	Suficientemente informado	Informado a medias
Total	3,8	38,1	39,6	18,5
Sexo				
Hombre	4,4	47,3	33,7	14,5
Mujer	3,3	30,8	44,1	21,7
Edad				
14 años	3,4	32,8	39,0	24,9
15 años	4,0	32,2	44,6	19,2
16 años	4,8	39,6	40,2	15,3
17 años	2,7	45,8	35,7	15,7
18 años	2,5	42,5	31,9	23,2
Titularidad				
Pública	3,3	39,2	38,1	19,4
Privada	5,7	33,6	45,6	15,2
Edad				
ESO	4,2	36,8	40,2	18,8
Bachillerato	4,0	33,7	41,9	20,5
CF Grado Medio		71,4	21,4	7,1
CF Grado Superior				

Aunque la proporción de los que dicen estar informados es similar entre chicos y chicas, aproximadamente tres de cada cuatro, hay un mayor número de ellos que hablan de una información completa mientras hay más chicas que señalan una información suficiente, En cuanto a los declaran estar mal informados, son algo más los chicos (4,4%).

Respecto de la variable edad, si bien existe relación entre la que tienen los alumnos encuestados y el nivel de información que dicen tener sobre el consumo de drogas, esta no es excesivamente significativa, De hecho, dicha relación se aprecia para los que manifiestan estar perfectamente informados pero no así para el resto de opiniones.


Tampoco resulta significativa la titularidad pública o privada de los centros donde cursan estudios los jóvenes extremeños, Si por una parte, los estudiantes de centros privados indican en proporción algo más de nivel de información, son, también, algo menos los de centros públicos que señalan estar mal informados.

En cuanto a las principales vías de información del alumnado extremeño sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibirla, podemos ver las opiniones en el gráfico 5.1.

Las vías más habituales de información son las charlas o cursos, profesores, padres (más las madres que los padres) y medios de comunicación, Lo son al menos para entre seis y siete de cada diez jóvenes, Entre tres y cuatro de cada diez dicen recibir información por escrito, de profesionales sanitarios, amigos, internet u organismos familiares, Prácticamente ningún encuestado indica carecer de algún tipo de información.

Por su parte, existe un menor acuerdo sobre los principales cauces por los que estos jóvenes deberían o quisieran recibir una mejor información, no tanto sobre las fuentes, pues las de recepción no son muy distintas a las que estiman serían las idóneas, si no al porcentaje de aquellos que las señalan, Aproximadamente de cada diez, cuatro hacen referencia a charlas, profesionales y madres, tres a padres, personas que han tenido relación con las drogas, medios de comunicación, internet, profesores, organismos oficiales y publicaciones, siendo el resto de opciones marginales.

GRÁFICO 5.1 PRINCIPALES VÍAS DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y OTRAS VÍAS POR LAS QUE PODRÍAN RECIBIR INFORMACIÓN



6. ENTORNO SOCIAL

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado, Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales y te relacionas habitualmente”, Solamente el 9,3% dice que en su entorno no se ha consumido ninguna de las drogas de la lista.

Analizando el consumo de las distintas sustancias el tabaco y el alcohol son la que tienen presentan un consumo más elevado, El tabaco es consumido en el entorno del 80% de los jóvenes, en mayor medida de las chicas, con una apreciable diferencia de 7,4 puntos, La más consumida de las drogas es el alcohol, el 88% dice que lo consumen en su entorno, en mayor medida también por las chicas, pero con una diferencia menor, 3,6 puntos, Pero no sólo se consume alcohol, el 73% es consciente de que entre sus amigos y compañeros ha habido borracheras en los treinta días anteriores, también se ha producido en el entorno de las chicas en proporciones más altas, pero con una diferencia de sólo 2,6 puntos.

Tabla 6,1, Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes

	Hombre	Mujer	Total	Diferencia Hom-Muj
Fumar tabaco	76,4	83,7	80,5	-7,4
Tomar bebidas alcohólicas	86,2	89,8	88,2	-3,6
Emborracharse	71,8	74,4	73,3	-2,6
Consumir hachís/ marihuana	45,0	44,3	44,6	0,7
Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir	5,1	12,6	9,3	-7,4
Consumir base (cocaína en base, crack)	5,2	8,6	7,1	-3,4
Consumir cocaína en polvo	6,0	10,1	8,3	-4,1
Consumir GBH o éxtasis líquido	1,8	2,0	1,9	-0,2
Consumir éxtasis	2,0	2,1	2,1	-0,1
Consumir speed y anfetaminas (metanfetamina, anfet, ice)	2,7	3,7	3,3	-1,0
Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)	2,6	3,4	3,1	-0,9
Consumir heroína	2,2	1,5	1,8	0,7
Consumir inhalables volátiles	1,4	0,5	0,9	0,8
Inyectarse drogas	1,4	0,7	1,0	0,8
Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís)	12,2	22,5	18,0	-10,3
Consumo de alguna droga ilegal incluido hachís	46,8	48,9	48,0	-2,1
No consumen ninguna de las drogas	10,9	8,0	9,3	2,9

El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida, el 44% dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes y en mayor medida por los chicos, aunque la diferencia es muy pequeña, 0,7 puntos, El resto de drogas se consumen en proporciones mucho menores, las más frecuentes son los tranquilizantes y pastillas para dormir, utilizada entre los amigos del 9,3% de los escolares y con una proporción mucho más elevada en el entorno de las chicas, una diferencia de 7 puntos, Le sigue el consumo de cocaína en polvo, 8,3%, y de cocaína base, 7,1%, también de manera más frecuente en el entorno de las chicas.

El resto de sustancia tiene proporciones mucho menores, por debajo del 5% dicen que son consumidas en su entorno, Pero la exposición en proporciones reducidas a cada uno de las drogas no refleja de manera suficiente el consumo de las amistades de los escolares extremeños al conjunto de drogas ilegales, En la tabla hemos añadido los resultados de analizar el consumo en su conjunto, y así tenemos que un 18% de los jóvenes dicen que entre sus amigos y compañeros se consume al menos una de las drogas ilegales excluyendo el hachís, de nuevo encontramos que es más frecuente en el entorno de las chicas, 10 puntos de diferencia, Si incluimos también el hachís, son el 48% de los jóvenes los que dicen que en su entorno se ha consumido en el último mes algunas de las drogas, y en muchos casos más de una.

El consumo de drogas es en algunos casos desencadenante de incidentes más graves, Para medir este efecto se les preguntaba a los jóvenes si habían tenido la lista de los incidentes que tenemos en la tabla, y en el caso de responder afirmativamente si habían consumido alguno de las sustancias en las dos horas anteriores.

El más frecuente es la participación en peleas, el 12% de los encuestados, sean o no consumidores de drogas, han participado en alguna el último año, De los que se vieron involucrados en peleas casi el 40% habían consumido alguna de las drogas más frecuentes, siendo los más numerosos los consumidores de alcohol, un 25,6 de los que tuvieron algún conflicto.

Un 6,7% había necesitado asistencia sanitaria urgente en el año anterior, De ellos un 17% había consumido, en las horas previas, alguna de las drogas contempladas, siendo la más frecuente el alcohol, el 10% de los que necesitaron asistencia sanitaria.

Muy pocos, el 2,2%, habían sufrido un accidente de tráfico conduciendo ellos el vehículo, De éstos el 13% habían consumido hachís y el 10% alcohol, Detenciones por las fuerzas de seguridad han sufrido el 1,5% a lo largo de todo el año anterior, un 30% de ellos en las dos horas siguientes de haber consumido drogas, siendo la más frecuente la cocaína, sustancia consumida por el 18,6%.

Tabla 6.2. Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta

	Alumnos Implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Total sí han consumido
Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último año siendo el conductor/a	2,2	10,7	13,0	3,8	
Ha participado en alguna pelea en el último año	12,0	25,6	11,5	1,7	
Ha recibido asistencia médica o sanitaria urgente en el último año	6,7	10,3	4,2	1,5	
Ha sido detenid@ por la policía o guardia civil el último año	1,5	4,9	6,8	18,6	
Total de alumnos involucrados en algún incidente	18,4	21,0	10,7	3,6	35,3

Las relaciones con los padres son en general buenas o muy buenas, para el 86,7% dicen que son así con sus padres y para el 84,6% lo son con sus madres, Los chicos mantienen, tanto con sus padres como con sus madres, buenas relaciones en proporciones superiores a los de las chicas: más del 91% de los chicos en proporciones prácticamente iguales con padres y madres, mientras que las chicas mantienen mejores relaciones con las madres, 83,4%, que con los padres, 79%.

Por edades podemos ver como los alumnos consideran que las relaciones con sus padres se van deteriorando a medida que cumplen más años: mientras que a los 14 y 15 años alrededor del 90% tienen relaciones buenas o muy buenas tanto con sus padres como con sus madres, a los 18 años esta proporción se ha reducido hasta el 73% en relación con el padre y al 78% referente a la madre.

Tabla 6.3. ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres?

	Padre					Madre				
	Muy malas	Bastante malas	Regulares	Bastante buenas	Muy buenas	Muy malas	Bastante malas	Regulares	Bastante buenas	Muy buenas
Total	1,0	1,1	11,2	32,5	54,2	2,2	1,7	11,6	35,8	48,8
Sexo										
Hombre	1,0	0,7	6,5	37,4	54,4	1,0	1,2	6,7	35,2	55,9
Mujer	3,0	2,5	15,5	34,6	44,4	0,9	0,9	14,7	30,3	53,1
Edad										
14 años	0,5	1,0	8,6	41,6	48,3	0,5	0,9	10,3	39,9	48,4
15 años	1,9	0,6	7,7	37,2	52,6	1,2	0,3	7,4	33,5	57,5
16 años	1,4	1,8	12,9	36,6	47,4	0,2	1,1	12,8	32,0	53,8
17 años	6,2	2,9	11,5	35,0	44,4	1,6	2,4	10,6	28,9	56,5
18 años		2,8	24,1	18,5	54,6	2,7		19,1	24,5	53,6
Titularidad del centro										
Pública	1,8	1,8	11,0	34,7	50,8	0,9	0,9	9,7	32,1	56,3
Privada	3,4	1,1	14,2	40,2	41,0	1,5	1,9	17,4	33,3	45,8
Nivel de enseñanza										
ESO	2,3	1,9	9,7	37,1	49,0	1,1	1,2	9,8	34,6	53,3
Bachillerato	2,3	1,7	14,3	35,5	46,2	1,0	1,0	13,0	30,4	54,5
FP Grado Medio			13,0	27,0	60,0			13,0	27,0	60,0

Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con sus padres que los de centros privados, especialmente con las madres, con las que hay una diferencia de 9 puntos, Por nivel de enseñanza sigue las mismas pautas que con la edad: los más jóvenes, estudiantes de eso, tienen mejores relaciones con sus padres y madres que los de bachillerato, más mayores.

También se les preguntó por situaciones conflictivas experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla, La más frecuente es el conflicto importante con padres y/o hermanos, que la han tenido el 27,8% de los escolares extremeños, más frecuente, con proporciones por encima de la media, la han tenido las chicas, 13 puntos más que los chicos, Comparando la situación por edades tenemos que la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, así, el 47,3% de los mayores de 18 años dicen haber tenido conflictos importantes y les siguen, con el 31%, los que tienen 16 y 15 años, La diferencia entre los que tienen conflictos en mayor proporción y los que menos es de 29 puntos.

Las diferencias por titularidad del centro son pequeñas, 1,3 puntos, dándose en mayor medida entre los alumnos de centros privados, y por

nivel de enseñanza aumenta al avanzar ésta, destacando en este caso la FP de grado medio en la que el 47% dice haberlos tenido.

Tabla 6.4. ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las situaciones siguientes?

	Conflicto o discusión importante con padres o herman@s el último año	Ha sufrido un robo o atraco el último año	Ha escapado de casa durante más de un día el último año	Ha sido expulsad@ del centro educativo durante un día completo o más el último año
Total	27,8	5,2	2,0	3,1
Sexo				
Hombre	20,4	4,7	1,5	5,6
Mujer	33,6	5,4	2,4	1,2
Edad				
14 años	21,0	5,6	1,9	1,9
15 años	18,0	2,4	0,6	2,4
16 años	31,5	5,2	2,0	4,7
17 años	31,7	8,1	3,6	4,0
18 años	47,3	6,3	2,7	
Titularidad del centro				
Pública	27,5	5,2	1,8	3,0
Privada	28,8	5,2	2,6	3,4
Nivel de enseñanza				
ESO	23,3	3,0	2,0	4,5
Bachillerato	31,1	6,8	2,3	1,8
FP Grado Medio	47,0	13,0		

Relacionado con los conflictos o discusiones familiares está el haberse escapado de casa, situación que dicen haber vivido el 2% de los escolares, más frecuente entre las mujeres, los de mayor edad, 17 y 18 años, y entre los alumnos de centros privados, aunque en este caso las diferencias son mínimas.

Situación conflictiva con el centro educativo, hasta el extremo de haber sido expulsados al menos un día en el último año, esto les ha sucedido al 3,1% de los alumnos, Esta situación es mucho más frecuente entre los varones que las mujeres, 5,6 y 1,2% respectivamente, entre los que tienen 16 y 17 años (inexistente entre los de 18 años) y entre los estudiantes de ESO, sin diferencias apreciables por titularidad del centro.

Por último tenemos que han sido víctimas de un robo o atraco el 5,2% de los escolares, habiendo algo más de víctimas entre las chicas que entre los chicos, entre los mayores y estudiantes de Bachillerato y FP.

Se les planteó a las escolares si los padres fijan con claridad las normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa, Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer en casa, el 68% dice que las fijan casi siempre o a menudo, no sucede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en la que responden de la misma manera el 39%.

Dentro de casa entienden que existen normas claras en mayor medida los chicos que las chicas, con una diferencia de 7 puntos, y los menores de 14 años, que lo entiende así el 74%, el grupo con una proporción más elevada, la diferencia con el grupo de edad que en menor medida se manifiestan de la misma manera, los que tienen 17 años, es de 10 puntos, En el resto de los grupos no hay diferencias sustanciales.

Tabla 6.5. Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	7,7	7,9	16,2	25,4	42,9
Sexo					
Hombre	6,3	7,5	13,9	29,0	43,4
Mujer	8,7	8,2	17,9	22,6	42,5
Edad					
14 años	7,0	4,7	14,0	22,9	51,4
15 años	3,3	7,5	18,9	25,7	44,6
16 años	6,6	10,7	16,6	27,3	38,9
17 años	10,1	7,7	18,5	23,8	39,9
18 años	21,1	4,6	4,6	25,7	44,0
Titularidad del centro					
Pública	7,3	7,7	16,2	24,6	44,2
Privada	9,0	8,6	16,2	28,6	37,6
Nivel de enseñanza					
ESO	7,6	7,0	16,3	23,3	45,8
Bachillerato	5,2	11,0	16,7	26,9	40,3
FP Grado Medio	20,2		13,1	33,3	33,3

En relación con la existencia de normas claras sobre lo que pueden hacer fuera de casa, que tenemos en la tabla siguiente, también lo tienen claro en mayor proporción los chicos que las chicas pero con una diferencia menor, menos de 4 puntos, Los que tienen catorce años vuelven a ser el grupo que en mayor medida dicen tener normas claras de comportamiento, el 68%, gran diferencia con los jóvenes de 17 años, que sólo lo dicen en el 25% de los entrevistados, En la misma línea de

importancia de la edad, los estudiantes de ESO manifiestan en mayor medida la existencia de normas claras, el 44% frente al 36% de los estudiantes de bachillerato, No hay diferencias en función de que los centros sean públicos o privados.

Tabla 6.6. Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	18,6	18,2	24	21	18,2
Sexo					
Hombre	15,1	18,2	25,5	20,4	20,7
Mujer	21,4	18,1	22,9	21,4	16,2
Edad					
14 años	14,4	13,0	24,2	25,1	23,3
15 años	15,0	16,5	24,6	24,9	19,2
16 años	17,1	19,9	21,8	20,8	20,4
17 años	25,5	22,6	26,8	15,1	10,0
18 años	29,1	17,3	25,5	13,6	14,5
Titularidad del centro					
Pública	18,1	17,7	25,1	20,5	18,6
Privada	20,4	20,4	19,6	23,0	16,6
Nivel de enseñanza					
ESO	17,2	15,3	23,4	24,0	20,1
Bachillerato	17,4	23,1	23,8	18,6	17,1
FP Grado Medio	37,9	14,9	31,0	8,0	8,0

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van también al salir de noche, Los resultados los tenemos reflejados en las dos tablas siguientes, Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes, mientras que el 75% dicen que sus padres saben “A menudo” o “Casi siempre” con quién están cuando salen de noche, y sólo se manifiestan de la misma manera el 58% al preguntare si saben dónde están.

Dicen en mayor medida con quién salen de noche las chicas, 78%, que los chicos, 71%, y prácticamente no existen diferencias reseñables en el resto de categorías, Por edad la mayor diferencia existente es la que hay entre los escolares de 14 años, entre los cuales el 76% dicen que sus

padres saben con quién están, y los que tienen 17 años, que lo dicen el 71%.

A la cuestión del conocimiento de donde están los comportamientos de las distintas categorías sociales son similares, Las chicas siguen diciéndolo con mayor frecuencia, 71% frente al 56% de los chicos, pero vemos que la diferencia entre ellos se ha ampliado mucho, y también que los dos, chicas y chicos, dicen con menos frecuencia donde van que con quién van.

Tabla 6.7. "Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	5,1	5,8	14,2	18,7	56,2
Sexo					
Hombre	5,6	7,5	15,7	19,3	52,0
Mujer	4,7	4,4	13,0	18,1	59,7
Edad					
14 años	3,3	3,7	16,8	19,6	56,5
15 años	4,8	4,8	11,2	23,9	55,3
16 años	4,6	6,9	16,0	18,8	53,8
17 años	5,7	8,9	14,2	11,4	59,8
18 años	11,2	2,8	11,2	15,9	58,9
Titularidad del centro					
Pública	4,5	5,9	14,6	17,5	57,5
Privada	7,6	5,3	12,9	23,1	51,1
Nivel de enseñanza					
ESO	5,6	4,9	14,1	19,8	55,6
Bachillerato	4,2	7,1	12,9	19,4	56,5
FP Grado Medio	6,9	6,9	19,8	6,9	59,4

En esta cuestión en función de la edad sí que existen diferencias de comportamiento, pero estas no parecen responder a una lógica, Los mayores que tienen 18 años son los que tienen menos reparos en decir al lugar al que van, lo dicen el 70% de ellos, mientras que los que con menos frecuencia hacen saber a sus padres el lugar al que van son los que tienen 17 años 49%, En relación con las otras variables tampoco se observan diferencias notables, los padres de los colegios públicos conocen con más

frecuencia el lugar en el que están sus hijos, 59%, que el de los colegios privados, 56%.

Tabla 6.8. "Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	8,2	9,7	23,8	22,9	35,3
Sexo					
Hombre	9,5	13,3	22,6	21,6	33,0
Mujer	7,3	7,1	24,5	24,0	37,1
Edad					
14 años	8,5	10,4	21,2	23,6	36,3
15 años	8,5	7,9	21,6	24,6	37,4
16 años	7,7	9,3	26,2	23,9	32,8
17 años	5,9	12,7	32,6	14,8	33,9
18 años	13,5	9,9	6,3	30,6	39,6
Titularidad del centro					
Pública	7,4	8,5	25,2	22,8	36,1
Privada	11,4	14,8	17,9	23,6	32,3
Nivel de enseñanza					
ESO	9,0	10,3	21,2	21,4	38,1
Bachillerato	7,3	10,6	23,8	25,7	32,6
FP Grado Medio	7,4		42,6	21,3	28,7

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción sobre la posibilidad que tienen de sentirse queridos tanto por sus padres y madres como por sus mejores amigos, Agregando las categorías "A menudo" o "Casi siempre" tenemos que el 85% de los jóvenes considera tiene accesible el cariño de sus padres y el 84% de la misma manera de su mejor amigo.

Atendiendo solamente a la categoría "casi siempre" son dos de cada tres los que estiman fácil tener el cariño de sus padres, Más fácil sienten tenerlo las chicas que los chicos (6 puntos de diferencia), los más jóvenes que los mayores (diferencia de 14 puntos) y los alumnos de los colegios públicos que de los privados (diferencia de 3,5 puntos).

Un 6% dicen tener dificultades para recibir "cariño y cuidado" de su padre o madre, son los que dicen "casi nunca" y "raramente", que en el caso de los que tienen 18 años llega al 17% los que tienen dificultades para recibir cariño.

Tabla 6.9. "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	2,0	4,0	9,0	19,6	65,5
Sexo					
Hombre	2,2	5,0	11,3	24,1	57,4
Mujer	1,7	3,3	7,2	16,1	71,7
Edad					
14 años	3,3	1,9	11,7	12,6	70,6
15 años	0,6	2,7	7,3	21,5	68,0
16 años	1,6	5,1	8,5	17,3	67,4
17 años	2,8	1,2	8,9	28,3	58,7
18 años	2,8	14,0	11,2	15,9	56,1
Titularidad del centro					
Pública	1,8	3,5	8,6	20,0	66,2
Privada	2,7	6,1	10,6	17,9	62,7
Nivel de enseñanza					
ESO	2,8	3,8	9,1	19,6	64,7
Bachillerato	1,1	3,6	9,0	15,3	71,0
FP Grado Medio		6,9	6,9	39,6	46,5

En relación con el cariño y cuidado de su mejor amigo o amiga, la situación es similar pero en proporciones más bajas, El 84% estima que lo puede tener sin problemas, la suma de los que dicen "a menudo" y "casi siempre", Existe una diferencia importante en la percepción de chicos y chicas, ya que el 91% de las chicas dicen que pueden tenerlo de manera frecuente frente al 75% de los chicos.

Si analizamos las diferencias existente entre los que dicen "casi siempre", tenemos que del conjunto el 58% considera que lo puede recibir "casi siempre", con una diferencia mucho mayor entre las chicas y los chicos (23 puntos de diferencia), los más jóvenes que los mayores (diferencia de 17 puntos) y en este caso los alumnos de los colegios privados más que los de los públicos (2 puntos de diferencia).

Los que tienen dificultades para recibir cariño de sus amigos, los que responden "casi nunca" y "raramente" no llegan al 6%, algo menos que en relación con los padres, y en esta caso las diferencias entre unos y otros son poco relevantes.

Tabla 6.10. "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amig@"

	Casi nunca	Raramente	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Total	1,8	3,9	10,6	25,5	58,2
Sexo					
Hombre	2,4	7,0	15,6	29,4	45,5
Mujer	1,3	1,5	6,8	22,5	68,0
Edad					
14 años	2,8	3,7	11,7	21,0	60,7
15 años	1,5	5,1	12,7	22,9	57,8
16 años	1,1	3,9	8,3	26,4	60,2
17 años	2,0	3,3	11,1	24,6	59,0
18 años	2,7	2,7	10,9	40,0	43,6
Titularidad del centro					
Pública	1,8	3,7	11,1	25,6	57,8
Privada	1,9	4,5	8,7	25,0	59,8
Nivel de enseñanza					
ESO	2,1	5,0	11,5	23,3	58,1
Bachillerato	1,7	2,9	6,9	25,8	62,6
FP Grado Medio			20,0	40,0	40,0

7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conocimiento de esas relaciones.

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo diario de tabaco y las relaciones con los padres, La hipótesis de partida es que existe una relación directa entre el consumo de tabaco y las relaciones con los padres, de forma que los mayores consumidores tienen peores relaciones con sus padres, Si bien esa relación parece existir, no está clara cuál de las variables influye en la otra, por eso hemos elaborado dos tablas distintas con las mismas variables, En la primera de las pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco.

En principio podemos observar que el comportamiento no es igual en la relación que existe con los padres y con las madres, Con los padres parece que existe un mayor grado de asociación entre las variables, ya que podemos observar como entre los que tienen mejores relaciones con sus padre, los que dicen que son “muy buenas” o “bastante buenas”, hay proporciones más altas de no fumadores, y entre los que tienen peores relaciones, los que dicen que son “regulares”, “bastante malas” o “muy malas”, hay proporciones más elevadas de fumadores.

La influencia del consumo de tabaco en las relaciones que se mantienen con la madre parece no existir, ya que hay más fumadores entre los que dicen tener “muy buenas”, “regulares” y “bastante malas” relaciones con su madre y mas no fumadores entre los que dicen tenerlas “bastante buenas” y “muy malas”, es decir no siguen ningún patrón de comportamiento.

Tabla 7.1.1 Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco

	Fuma	No fuma
Padre		
Muy malas	4,0	1,8
Bastante malas	5,1	1,1
Regulares	17,6	10,7
Bastante buenas	27,8	37,0
Muy buenas	45,5	49,3
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00001		
Madre		
Muy malas	0,0	1,2
Bastante malas	1,7	1,0
Regulares	13,1	10,9
Bastante buenas	28,0	33,1
Muy buenas	57,1	53,8
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,26980		

Hemos calculado el test de la Chi-cuadrado de Pearson para cada una de las tablas, relación con el padre y con la madre, Este estadístico es significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar que existe una relación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo de relaciones que se mantiene con el padre y no entre el consumo y el tipo de relaciones que se mantiene con la madre.

En la siguiente tabla lo que pretendemos analizar es si el tipo de relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los padres.

En la tabla podemos observar que como hay muchos más no fumadores que fumadores los porcentajes son siempre más altos entre los no fumadores, pero la diferencia entre la proporción de fumadores y no fumadores es mayor para los ítems que indican buenas relaciones que para los que indican malas relaciones con el padre, En relación con la madre las diferencias son más similares en todos los ítems del tipo de relación.

Tabla 7.1.2 Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con tus padres

	Fuma	No fuma
Padre		
Muy malas	25,0	75,0
Bastante malas	40,0	59,1
Regulares	20,3	79,7
Bastante buenas	10,4	89,6
Muy buenas	12,4	87,6
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00001		
Madre		
Muy malas		100,0
Bastante malas	21,4	78,6
Regulares	15,4	84,6
Bastante buenas	11,3	88,7
Muy buenas	13,8	86,2
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,26980		

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el hecho de que fumen todos los días al menos uno de las personas con las que convive el entrevistado y el que los escolares sean fumadores, En la tabla vemos que los escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una proporción mucho más elevada, 10 puntos de diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual, sí que puede haberlos esporádicos, en su hogar.

Tabla 7.2. ¿Alguna de las personas con las que convives fuma diariamente? según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma o no fuma a diario
No	8,5	91,5
Sí	18,6	81,4
Vive en centro educativo	100,0	
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000		

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de asociación entre las dos variables, El reducido número de alumnos que vive en un centro educativo hace que los resultados del mismo no tengan ninguna significación.

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno para fumar, Vemos que hay más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el hecho de fumar, con un incremento muy importante, con un comportamiento muy similar tanto en relación con el Padre como con la Madre.

Tabla 7.3. Permiso paterno y materno para fumar según consumo diario de tabaco

	Fuma a diario	No fuma a diario
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	7,9	92,1
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,0	67,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	50,0	50,0
No sabes	23,6	76,4
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	6,4	93,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	49,6	50,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	72,5	27,5
No sabes	18,5	81,5
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000		

Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar (responde “No me lo permite en absoluto”) la proporción de fumadores habituales es muy baja (8% y 6,4% según sea el padre o la madre respectivamente), La proporción sube de manera espectacular si el progenitor es tolerante (“Sí me lo permite, pero no en casa”) el 33% si el tolerante es el padre y el 50% si la tolerante es la madre, Y si el progenitor es totalmente permisivo (“Sí, me lo permite en cualquier sitio”) la proporción de fumadores diarios se incrementa hasta el 50% si este es el padre o el 72% si la permisiva es la madre.

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tolerancia de los progenitores, que en realidad lo podemos considerar como una valoración intermedia entre “no me lo permite en absoluto” y “Me lo permite, pero no en casa”, la proporción de escolares que son fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, tanto en relación con el padre como con la madre.

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y materna hacia dicho consumo, Aunque siempre nos podemos plantear si dicha relación se retraolimenta.

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de tabaco, La tabla siguiente nos muestra los resultados en los que vemos que entre los que no han repetido curso lo tasa de fumadores habituales es baja, 6%, y que esta se incrementa notablemente entre los que han repetido un curso y sobre todo entre los que han repetido dos cursos, hasta el 39%, en este último caso.

Tabla 7.4. ¿Has repetido curso alguna vez?

	Fuma a diario	No fuma a diario
No	6,3	93,7
Sí, un curso	20,0	80,0
Sí, dos o más cursos	38,8	61,3

A continuación vamos a analizar la relación existente entre el consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia de estos al consumo.

Vemos que tanto los tienen relaciones buenas como malas con su padre han consumido en las mismas proporciones alcohol en los 30 días anteriores, teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones “regulares”, 77%, En relación con la madre, la situación es similar: los que dicen tener relacione regulares con sus padres presentan consumos más altos, 73%, seguidos por los que tienen relaciones malas y por últimos por los que tienen relaciones buenas con su madre, en los que el 64% ha consumido alcohol en el mes anterior.

De estos datos no podemos deducir la existencia de una asociación clara entre el consumo de alcohol y las relaciones con los padres, aunque la chi-cuadrado nos muestra la existencia de asociación entre las relaciones con el padre y el consumo de alcohol.

Tabla 7.5. Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol en los últimos 30 días

	¿Ha consumido alcohol?		¿Se ha emborrachado?	
	Consumo alcohol	No consume	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Padre				
Muy o bastante malas	64,0	36,0	64,0	36,0
Regulares	77,1	22,9	62,7	37,3
Muy o bastante buenas	63,5	36,5	44,3	55,7
Chi-cuadrado	p= 0,0040		p= 0,0000	
Madre				
Muy o bastante malas	67,9	32,1	57,1	42,9
Regulares	73,2	26,8	63,8	36,2
Muy o bastante buenas	64,0	36,0	44,2	55,8
Chi-cuadrado	p= 0,0840		p= 0,0000	

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días, Tenemos en las columnas de la derecha como mientras peores relaciones tienen con el padre se han emborrachado en mayor proporción, algo similar ocurre en relación con la madre, aunque en este caso la proporción más alta la encontramos entre los que tienen relaciones regulares, En los dos casos la prueba de la chi-cuadrado nos muestra como las relaciones son significativas.

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los treinta días anteriores, Tanto con el padre como con la madre el comportamiento es similar, a medida que el progenitor es más permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol, incrementándose en unos 30 puntos porcentuales en cada caso, Las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una clara asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres.

El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es mucho más frecuente que el del tabaco.

Tabla 7.6. Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas

	Consume alcohol	No consume
Padre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	55,0	45,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	78,1	21,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	87,8	12,2
No sabes	62,7	37,3
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,00000$		
Madre		
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	56,8	43,2
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	83,7	16,3
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	84,7	15,3
No sabes	59,5	40,5
Chi-cuadrado de Pearson $p= 0,00000$		

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de curso y el consumo de alcohol, hemos encontrado los resultados que tenemos en la tabla siguiente, Vemos que la proporción de escolares que consumen alcohol aumenta al repetirse curso, de los que han repetido un curso consumen alcohol el 72%, 12 puntos más que entre los que no han repetido, si han repetido dos curso la proporción de consumidores llega al 80%.

Tabla 7.7. ¿Has repetido curso alguna vez?

	Consume alcohol	No consume
No	59,5	40,5
Sí, un curso	72,1	27,9
Sí, dos o más cursos	80,0	20,0

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su padre y su madre en función del consumo de las sustancias que hemos venido analizando en la encuesta.

En principio hay que señalar que sólo hay un número importante de consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado, de las otras solamente se puede constatar su presencia en los centros educativos, Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos

muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes y su valor como dato significativo.

La mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y el consumo de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores relaciones con los progenitores.

Hay un comportamiento diferente de los padres y las madres, Así, para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que los datos tienen significación, a medida que el consumo se hace más frecuente (pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores relaciones con sus madres que los esporádicos.

Pudiera ser que las madres se oponen en la misma medida que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte de sus hijos pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres.

Tabla 7.8.1 RELACIONES CON EL PADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	1,7	9,9	88,4	947
	Sí, no diario	9,3	13,9	76,8	194
	A diario	9,1	17,7	73,1	175
Consumo de alcohol	No	3,6	8,1	88,4	558
	Sí, no diario	3,4	13,8	82,9	683
	20 o más días al mes	10,1	17,7	72,2	79
Emborracharse	No	3,2	9,3	87,4	963
	Sí, no diario	5,8	17,3	76,9	347
	20 o más días al mes		37,5	62,5	8
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	3,1	10,7	86,2	1231
	Sí, no diario	17,5	19,3	63,2	57
	20 o más días al mes		58,3	41,7	12
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	3,6	11,1	85,3	1277
	Sí, no diario	4,2	29,2	66,7	24
	20 o más días al mes				
Consumo de hachís	No	3,0	10,7	86,3	1122
	Sí, no diario	6,3	19,4	74,4	160
	20 o más días al mes	15,0		85,0	20
Consumo de cocaína base/crack	No	3,7	11,6	84,7	1302
	Sí, no diario			100,0	6
	20 o más días al mes				
Consumo de cocaína polvo	No	3,8	11,6	84,6	1314
	Sí, no diario			100,0	2
	20 o más días al mes			100,0	1
Consumo de cocaína base o polvo	No	3,8	11,7	84,5	1308
	Sí, no diario			100,0	7
	20 o más días al mes			100,0	3
Consumo de GHB	No	3,8	11,6	84,6	1317
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de éxtasis	No	3,8	11,6	84,6	1317
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de speed	No	3,8	11,6	84,6	1317
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de alucinógenos	No	3,8	11,6	84,6	1318
	Sí, no diario				
	20 o más días al mes				
Consumo de heroína	No	3,8	11,6	84,6	1316
	Sí, no diario			100,0	2
	20 o más días al mes				
Consumo de sustancias volátiles	No	3,8	11,6	84,6	1314
	Sí, no diario			100,0	4
	20 o más días al mes				

Tabla 7.8.2 RELACIONES CON LA MADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		Muy o Bastante malas	Regulares	Muy o Bastante buenas	Nº de casos N=
Consumo de tabaco	No	2,0	9,3	88,8	961
	Sí, no diario	2,6	19,0	78,5	195
	A diario	1,7	13,1	85,1	175
Consumo de alcohol	No	1,8	8,4	89,9	562
	Sí, no diario	2,3	13,5	84,1	694
	20 o más días al mes	2,6	10,5	86,8	76
Emborracharse	No	1,9	8,9	89,2	980
	Sí, no diario	2,6	17,9	79,5	346
	20 o más días al mes			100,0	7
Consumo de tranquilizantes (con o sin receta)	No	1,6	11,0	87,4	1238
	Sí, no diario	12,7	6,3	81,0	63
	20 o más días al mes		58,3	41,7	12
Consumo de tranquilizantes (sin receta)	No	1,9	11,4	86,8	1286
	Sí, no diario	14,8		85,2	27
	20 o más días al mes				
Consumo de hachís	No	2,1	10,3	87,6	1133
	Sí, no diario	1,2	15,9	82,9	164
	20 o más días al mes	10,5	15,8	73,7	19
Consumo de cocaína base/crack	No	2,1	11,1	86,8	1316
	Sí, no diario			100,0	6
	20 o más días al mes				
Consumo de cocaína polvo	No	2,1	11,2	86,7	1329
	Sí, no diario			100,0	2
	20 o más días al mes			100,0	1
Consumo de cocaína base o polvo	No	2,1	11,3	86,6	1322
	Sí, no diario			100,0	7
	20 o más días al mes			100,0	3
Consumo de GHB	No	2,1	11,2	86,7	1331
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de éxtasis	No	2,1	11,2	86,7	1331
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de speed	No	2,1	11,2	86,7	1331
	Sí, no diario			100,0	1
	20 o más días al mes				
Consumo de alucinógenos	No	2,1	11,2	86,7	1332
	Sí, no diario				
	20 o más días al mes				
Consumo de heroína	No	2,1	11,2	86,7	1330
	Sí, no diario			100,0	2
	20 o más días al mes				
Consumo de sustancias volátiles	No	2,1	11,2	86,7	1328
	Sí, no diario			100,0	4
	20 o más días al mes				