

ENCUESTA ESTATAL SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES) 2010, ESPAÑA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA
SOCIAL E IGUALDAD



MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD



plan nacional sobre drogas

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE ESTUDES 2010

→ Antecedentes:

- Desde 1994, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España (ESTUDES).

→ Muestra:

- En 2010: 31.967 estudiantes de 857 centros educativos públicos y privados y 1730 aulas.

→ Objetivos:


- Conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años y
- Orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

Evolución del tamaño de muestra ESTUDES, 1994-2010

España cuenta con una de las mayores encuestas escolares a nivel mundial

Valor añadido ESTUDES:

1. Muestra
2. Serie histórica dilatada y bienal
3. Flexibilidad: Módulos específicos




Proporción de consumidores de drogas en el último año (%)


ESTUDES, 2010

→ Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años siguen siendo **el alcohol, el tabaco y el cannabis**.

→ En 2010, se observa una reducción del consumo de la mayoría de las sustancias, más acusado en el caso del **tabaco, del cannabis y de la cocaína**.




Proporción de consumidores de drogas en el último año SEGÚN SEXO (%) . ESTUDES, 2010



Edad media de inicio en el consumo de drogas


ESTUDES, 2010

La **edad media** de inicio en el consumo de drogas se mantiene **estable**



Evolución de la prevalencia de consumo de BEBIDAS ALCOHÓLICAS y prevalencia de borracheras (últimos 30 días) (%). ESTUDES, 1994-2010

- Extensión del consumo se mantiene estable
- Consumo intensivo (borracheras) aumenta (3 de cada 10 se emborrachan)
- Prevalencia de consumo en mujeres aumenta




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
■ Consumo alcohol alguna vez	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1
◆ Consumo alcohol últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6
■ Consumo alcohol últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63
◆ Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28	25,6	29,1	35,6


Tipo de BEBIDA ALCOHÓLICA consumida según el día de la semana

ESTUDES, 2010

- En los últimos 30 días, el 66,3% de los consumidores había bebido en bares o pubs, un 64,1% en espacios abiertos y un 57,5% en discotecas.
- Los lugares donde los estudiantes consiguieron con más frecuencia bebidas alcohólicas fueron bares o pubs (52,1%), discotecas (43,5%) y supermercados (49,3%).



FIN DE SEMANA



DÍA LABORABLE


Consumo de TABACO ESTUDES, 2010

- El 39,8% de los estudiantes de 14-18 años fumó tabaco alguna vez en la vida, el 32,4% en los últimos 12 meses y el 12,3% (25,2% entre los de 18 años) lo hizo diariamente en los últimos 30 días.
- El consumo medio de cigarrillos diarios es 5,17, inferior al de 2004 (7,7) y 2006 (5,5).
- En 2010, se confirma la tendencia descendente del consumo de tabaco, iniciada en 2004 y que coincidió con el debate social suscitado por la elaboración de la Ley 28/2005 del “Tabaco”. En 2004, el 21,5% de estudiantes fumaba diariamente, frente a un 14,8% en 2006 y 2008, y un 12,3% en 2010.
- La percepción de riesgo ante el consumo diario de tabaco sigue aumentando y la CASI TOTALIDAD (>90%) de los jóvenes opinan que puede producir muchos problemas de salud.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de TABACO, SEGÚN SEXO (%). ESTUDES, 1994-2010

→ El consumo está mas extendido entre las mujeres (13,6% fuma diariamente) que entre los hombres (11%).


Debate social
Ley 28/2005



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
■ Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11
◆ Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6
▲ percepción del riesgo de fumar un paquete diario	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4

Evolución de la proporción de consumidores de HIPNOSEDANTES sin receta, (%). ESTUDES, 1994-2010


El consumo de hipnosedantes es más elevado en las mujeres (6,7% en el último año) que en los hombres (4,4% en el último año).



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
■ Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4
■ Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6
▲ Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3

Evolución de la proporción de consumidores de CANNABIS (%). ESTUDES, 1994-2010


- Se confirma **tendencia descendente** iniciada en **2004**
- La **prevalencia de consumo diario** es de un **3%** (4,3% en chicos y 1,8% en chicas): España participa en un **proyecto Europeo de CONSUMO PROBLEMÁTICO DE CANNABIS (OEDT*)**



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
◆ Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33
■ Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4
▲ Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2

Evolución de la prevalencia de consumo de COCAÍNA (general) (%) ESTUDES, 1994-2010


→ Se confirma la **tendencia descendente** del consumo de cocaína, iniciada en 2004. Las prevalencias de consumo, en 2010, son inferiores a las de 1998.



◆ Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9
■ Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6
▲ Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2	1,5

Evolución de la prevalencia de consumo de ANFETAMINAS, ÉXTASIS y ALUCINÓGENOS en el último año (%). ESTUDES, 1994-2010


→ Se consolida la tendencia descendente iniciada en 2000 para todos los consumos en ambos sexos. Son las cifras más bajas desde el comienzo de las encuestas



Consumo de HEROÍNA ESTUDES, 2010

- La heroína es **la droga menos consumida** por los estudiantes de 14 a 18 años. En el 2010 un 1% la había probado alguna vez, un 0,6% la había consumido en el último año y un 0,5 % en el último mes previo a la encuesta.
- La **edad media de inicio** en el consumo de heroína (**14,4 años**) continúa siendo más temprana que la de otras drogas (cocaína, éxtasis, anfetaminas o alucinógenos).

Evolución del RIESGO PERCIBIDO por los estudiantes de 14-18 años ante el consumo habitual* de drogas. ESTUDES, 1994-2010



El alcohol es la sustancia que se percibe menos peligrosa.


El tabaco se considera más peligroso que el cannabis.

*Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: ESTUDES 1994-2010. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSPSI.

INFORMACIÓN RECIBIDA sobre las drogas y los efectos y problemas asociados. ESTUDES, 2010.

¿Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas? (%)



- Suficiente o perfectamente informados
- Informados a medias o mal informados

→ Las principales vías por las que los estudiantes RECIBEN información son: las **madres** (67,3%) y **padres** (61,1%), los **profesores** (61,4%), las **charlas/cursos** (67,5%) y los **medios de comunicación** (61%).

→ La vías por las que los jóvenes PREFERIRÍAN RECIBIR información sobre drogas son: los **profesionales sanitarios** (50,2%) y las **charlas/cursos** (49,9%) . A uno de cada cuatro jóvenes le gustaría obtenerla por **internet**.

Consumo de DROGAS EMERGENTES ESTUDES, 2010

- Se ha introducido, por primera vez, un módulo específico sobre este tipo de sustancias, en la Encuesta ESTUDES 2010. Novedoso en la Unión Europea.
- En España, **las sustancias de este tipo más consumidas son las setas mágicas (2,1%), el Spice (1,1%) y la ketamina (1,1%)** para el indicador de consumo alguna vez en la vida.
- Casi **la mitad de los encuestados** desconocen los problemas de salud que puede ocasionar la sustancia por la que se les pregunta. **La tercera parte de los que las consumen** tampoco conocen los problemas que ocasionan sobre su salud.
- Las sustancias que los estudiantes consideran **más fácilmente accesibles** son las **setas mágicas (50,3%), la ketamina (40,2%) y el spice (39,8%)**.
- Las **más difíciles de conseguir** son el **nexus, la mefedrona y las piperazinas**.